УДК 547.856.1: 542.9: 615.214.24

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНАЗОЛИНОНА В СВЕТЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И СПОСОБАХ СВЯЗЫВАНИЯ С МОЛЕКУЛАМИ-МИШЕНЯМИ. ОБЗОР

© 2023 г. М. А. Самотружева¹, А. А. Старикова^{1,*}, О. А. Башкина¹, А. А. Цибизова¹, А. В. Борисов², Д. В. Мережкина², И. Н. Тюренков², А. А. Озеров^{2,3}

Поступило 01.10.2022 г.

После доработки 19.01.2023 г.

Принято к публикации 25.01.2023 г.

В обзоре охарактеризована роль основных мишеней антибактериальных средств: “эффлюксных насосов”, ферментов (ДНК-гираз как подкласса топоизомераз, гомосеринтрансацилазы, различных классов сортаз, ароматазы, липотейхоевой синтазы, поликетидсинтазы, пантотенатсинтетазы, ацетил-КоА-карбоксилазы, сенсорной гистидинкиназы, киназы, циклооксигеназы и др.), пенициллин-связывающего белка, систем “кворум сигнала” и адгезинов в значимых биохимических процессах поддержания жизнедеятельности патогена и проявления им вирулентности. Показана возможность проявления противомикробного эффекта веществом при его связывании с белковыми молекулами, обуславливающими патогенность микроорганизма. Определена роль производных хиназолинона, проявляющих высокую реакционную способность, устойчивость в химических процессах и характеризующихся широким спектром фармакологической активности, в том числе и противомикробной в отношении различных грамположительных и грамотрицательных бактерий. Показано, что изменение структуры соединения введением различных заместителей способствует изменению степени гидрофильности и, как результат, определяет различную степень проникновения лекарства через клеточную мембрану; способность к образованию промежуточных комплексных соединений, стабилизированных системой водородных связей, а также ван-дер-ваальсовыми и стэкинг-взаимодействиями, с ферментативными мишенями, а также рецепторно-регуляторными белками и системами сигнализации клеток патогена. Представлены результаты по прогнозированию механизма действия синтезированных авторами статьи соединений методами математического моделирования. Оценена возможность создания комбинированных структур на основе ядра хиназолинона с различными гетероциклическими производными как продукта с ярко выраженной антимикробной активностью. Рассмотренные закономерности имеют практическое значение для специалистов в области медицинской химии, органического синтеза, биотехнологии, клинической фармакологии, фармацевтической химии и технологии, усилия которых направлены на получение нового лекарственного вещества.

Ключевые слова: мишени антибактериальных средств, эффлюксные насосы, пенициллин-связывающий белок, система “кворум сигнала”, производные хиназолинонов

DOI: 10.31857/S2686953522600672, **EDN:** YRQTZC

I. ВВЕДЕНИЕ

Объектом научного поиска в современной экспериментальной и клинической фармаколо-

гии является лекарственное вещество, обладающее высокой активностью, специфичностью, биодоступностью и необходимой продолжительностью действия, характеризующееся низкой токсичностью, минимальным количеством нежелательных побочных эффектов и стабильностью при хранении [1, 2].

Эволюция патогенных микроорганизмов и возникновение у них резистентности к противомикробным агентам, представленным на рынке, осложняют выбор фармакотерапевтической стратегии, способствуя в результате снижению эффективности и увеличению длительности лече-

¹ФГБОУ ВО “Астраханский государственный медицинский университет” Минздрава России, 414000 Астрахань, Россия

²ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный медицинский университет” Минздрава России, 400131 Волгоград, Россия

³ГБУ “Волгоградский медицинский научный центр”, 400131 Волгоград, Россия

*E-mail: alhimik.83@mail.ru

ния, что приводит к снижению контроля над инфекционным процессом. На сегодняшний день количество патогенных штаммов, проявляющих устойчивость к различным антибактериальным средствам, стремительно растет. Наиболее изученными мультирезистентными патогенами являются метициллин-резистентный *Staphylococcus aureus* (MRSA), пенициллин-резистентный *Streptococcus pneumoniae*, ванкомицин-резистентные *Enterococcus* и *Mycobacterium tuberculosis* [3–5].

Достижения в области геномики, биоинформатики и омических технологий по изучению новых мишеней для веществ с антимикробным действием и механизмов возникновения устойчивости к ним в значительной степени способствуют ускорению процесса открытия лекарств, проявляющих противомикробную активность и характеризующихся химической устойчивостью, растворимостью в воде и способностью эффективно проникать через биологические мембраны [3, 6].

II. МИШЕНИ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ С АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

II.1. Концепция эффлюксных насосов

Теория систем оттока, связанных с активностью “эффлюксных насосов”, и исследование механизма действия на них ингибиторов является одним из перспективных направлений поиска лекарственных средств с противомикробным эффектом [7].

В основе данной концепции лежат стратегия направленного связывания лекарств с цитоплазматическими насосами оттока; подавление источника энергии, необходимого для их работы, а также нацеливание на регуляторы ответа, активирующие транскрипцию генов мишени, а также гены формирования признаков вирулентности (например, *SrxAR* у *Enterobacteriaceae*, *AmgRS* у *P. aeruginosa*) [8, 9].

Описано строение эффлюксных насосов грамотрицательных бактерий. Показано, что в их состав входят три белка: транспортный, встроенный во внутреннюю мембрану клетки; периплазматический (адапторный), расположенный с верхней стороны транспортера; и белковый канал наружной мембраны, соединяющий транспортер с наружной бактериальной клеточной мембраной [10–12] (рис. 1).

Показано, что к патогенам, проявляющим устойчивость к большинству противотуберкулезных средств за счет функционирования эффлюксной помпы, относится *M. smegmatis*, в связи с чем его часто используют в качестве исследовательской модели при изучении механизмов возникновения резистентности к антимикробным агентам у *M. tuberculosis*, для которого характерны низкая проницаемость и вязкость клеточ-

ной стенки [14]. Показано, что ген *lfrA*, ответственный за низкий уровень устойчивости к фторхинолонам, составляет основу системы оттока, обуславливающей устойчивость к данному классу антибактериальных веществ у *M. smegmatis*. Мультилекарственный эффлюксный насос *QacA* опосредует устойчивость к соединениям с широким спектром противомикробной активности; работа *TcmR* у *S. glaucescens* делает устойчивым микроорганизм к действию стрептомицина [15].

Изучен механизм работы эффлюксной помпы *E. coli* – комплексной системы *AcrA3-AcrB3-TolC3*. Доказано, что отток гидрофобных соединений осуществляется в результате функционирования эффлюксных насосов *AcrAB*, *EmrA* и *MdfA*. Показана возможность связывания с липофильным производным *EmrA* и *MdfA*, расположенным внутри цитоплазмы, с последующим вытеснением в периплазму, где лекарственный агент взаимодействует с помпой *AcrAB* и экструдируется во внешнюю среду [15]. Доказано наличие 14 гидрофобных трансмембранных областей “эффлюксного насоса” надсемейства *M. smegmatis* (*LfrA*), обуславливающего устойчивость патогена к бромиду этидия, акрифлавинолу, доксорубину и фторхинолонам, с которыми происходит связывание неполярных функциональных центров соединений, в результате чего они либо удаляются из клетки, либо накапливаются, что приводит к уменьшению их концентрации. Работа эффлюксных насосов кодируется такими генами, как *lfrA* у *M. smegmatis*, *qacA* – *S. aureus*, *tcmA* – *S. glaucescens* и *actII* и *mmr* – *S. coelicoler* [16, 17].

II.2. Роль ингибирования топоизомеразы II

Обоснована возможность проявления веществами антибактериальных свойств за счет ингибирования ДНК-гиразы, относящейся к классу топоизомераз II типа и принимающей участие в репликации бактериальной ДНК, которая катализирует процесс АТФ-зависимой суперспирализации двухцепочечной замкнутой кольцевой ДНК, обуславливающий выживаемость патогена [18]. Обоснована роль ДНК-гиразы в каталитическом процессе удаления положительных спиралей, накапливающихся во время репликации и транскрипции ДНК. Описан механизм связывания топоизомеразы с ДНК, при котором происходит расщепление двух нитей ДНК, разделенных четырьмя парами оснований с последующим ковалентным присоединением остатка тирозина активного центра ДНК-гиразы к фосфатному остову нуклеиновой кислоты. Каталитическая реакция завершается лигированием расщепленных нитей ДНК [19–21].

Известно, что структура ферментов, относящихся к классу топоизомераз, регулирующих топологию ДНК во время транскрипции, реплика-

Рис. 1. Активная эффлюксная насосная система грамотрицательных бактерий для устранения антибиотиков из периплазмы (на примере аминогликозидов) [13].

ции, рекомбинации, репарации и митоза, представлена субъединицами *GyrA* и *GyrB*, которые образуют системы, осуществляющие димеризацию (ворота или интерфейсы) [22, 23]. Описана роль АТФ-гидролизующего GHKL (*Gyrase*, *Hsp90*, *HistidineKinase*, *MutL*) домена, формирующего N-ворота и ДНК-ворота, основу которых составляют домены *Toprim* и *WHD* (*Topoisomerase/Primase* и *Winged-helixdomain*). Интерфейс С-ворот обнаружен не у всех топоизомераз, а является составной частью только у ферментов II типа [24]. Доказано, что он расположен на С-конце А-субъединиц в виде С-концевого домена (СТД, *C-terminal domain*) и определяет специфичность топоизомераз к структурам ДНК [25, 26]. Обоснована гибель бактериальной клетки при ингибировании ДНК-гиразы веществом, проявляющим противомикробный эффект, вследствие разрушения ДНК [25]. Изучены основные стадии каталитического цикла топоизомеразы: связывание ДНК в области ДНК-ворот, вызывающее изгибание нуклеиновой кислоты; улавливание Т-сегмента ДНК между GHKL-доменами и ДНК-воротами; взаимодействие двух молекул АТФ с АТФ-азными центрами, способствующее диме-

ризации GHKL-доменов, закрыванию N-ворот и захвату Т-сегмента; расщепление G-сегмента ДНК тирозинами нуклеазных центров WHD-доменов за счет энергии, выделяющейся при гидролизе АТФ до АДФ; открытие ДНК-ворот и прохождение Т-сегмента через разрыв к С-воротам; лигирование G-сегмента в результате гидролиза второй молекулы АТФ; открытие N-ворот и возвращение фермента в исходное состояние (рис. 2) [26, 27].

Описанные аргументы дают основание полагать, что ДНК-гираза может быть рассмотрена в качестве мишени при поиске антибактериальных агентов. Отмечается, что по механизму действия вещества, проявляющие антимикробную активность за счет воздействия на топоизомеразы, можно разделить на яды и каталитические ингибиторы [27]. Соединения первой группы принимают участие в стабилизации промежуточного комплексного агломерата, образованного топоизомеразой и G-сегментом ДНК. Доказано, что при диссоциации субъединиц фермента происходит двухцепочечный разрыв ДНК, который приводит к гибели клетки. Действие каталитических ингибиторов, являющихся конкурентами АТФ,

Рис. 2. Каталитический цикл ДНК-топоизомеразы. Воздействие лекарственных веществ на отдельные стадии (на примере новобиоцина, кумермицина, стауроспорина, мербарона, акларубицина) [28].

основано на подавлении активности фермента за счет связывания с АТФ-азным центром GNKL-домена (рис. 2) [27–29].

III.3. Ферменты как мишень для антибиотиков

Большой интерес представляют ферменты, принимающие участие в биосинтезе аминокислот (метионина, треонина и изолейцина из аспарагиновой кислоты), протекающем в клетках многих грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий [30]. Обоснована роль метионина как важной N-концевой аминокислоты, используемой для синтеза белка, а также S-аденозилметионина, имеющего значение при синтезе ДНК и серосодержащих соединений [31]. Гомосеринтрансацилаза (НТА) является ферментом, катализирующим первый этап биосинтеза метионина — превращение L-гомосерина в O-ацетил-L-гомосерин (ОАHS) путем переноса ацетильной группы от ацетил-КоА на γ -гидроксил гомосерина [32]. Ингибирование активности гомосеринтрансацилазы способствует нарушению биосинтеза белка и ДНК, вследствие чего происходит гибель бактериальной клетки. Знание биосинтетической функции гомосеринтрансацилазы позволяет отнести ее к значимым мишеням, на которые направлено действие антибактериальных веществ [31, 32].

Значительную роль в развитии ряда бактериальных инфекций играет фермент сортаза А, катализирующий процесс бактериальной адгезии к клеточной стенке за счет образования многосубъединичных волосовидных волокон, участвующих также в усвоении питательных веществ в клетке хозяина и уклонении от иммунного ответа, обуславливая вирулентность микроорганизма [33, 34] (рис. 3).

Известно, что сортазы, охарактеризованные на сегодняшний день, функционируют как цистеинтранспептидазы, которые присоединяются к аминогруппе аминокислотных остатков белков, содержащих сигнал сортировки клеточной стенки (CWSS) [35, 36]. Изучены биохимические основы функционирования белка сортазы А в *S. aureus* (Sa-SrtA). Установлено, что белок-предшественник экспортируется из цитоплазмы и связывается с Sa-SrtA, через CWSS, содержащий мотив LPXTG (Leu-Pro-any-Thr-Gly). Впоследствии остаток цистеина в активном центре Sa-SrtA вступает в реакцию нуклеофильного замещения с треонином мотива LPXTG, нарушая треонин-глициновую пептидную связь. Образуется белково-сортазный комплекс, в котором компоненты связаны через тиаоцильную связь. Высвобождение белка из промежуточного комплексного соединения и перенесение его Sa-SrtA к липиду-предшественнику клеточной стенки с возникно-

Рис. 3. Примерная схема действия антибиотиков на сортазу А [34].

вением белково-липидного продукта составляет основу следующей стадии. Процесс завершается реакциями трансгликозилирования и транспептидации, лежащими в основе синтеза основных компонентов клеточной стенки, в ходе которых образующийся продукт включается в структуру пептидогликана, ковалентно связываясь с пептидом поперечного мостика [37, 38].

Сортазы по способности распознавать различные CWSS можно разделить на шесть различных семейств, которые имеют сходные аминокислотные последовательности. Присутствие энзимов А, В и С характерно для *Firmicutes*. Представители этой группы способны задерживать большое количество функционально различных белков в клеточной стенке, а также катализировать процесс присоединения гем-рецепторов к пептидогликану (класс В) и участвовать в сборке пилей (класс С). Ферменты класса D, обнаруженные у *Bacillus anthracis*, принимают участие в закреплении белков в мембране клетки и облегчении споруляции [39]. Доказано, что в *S. aureus*, *L. monocytogenes*, *S. pyogenes* и *S. pneumoniae* работу сортазы кодирует ген *srtA*. Показана возможность каталитически прикрепленного в присутствии сортазы В гемопротейна IsdC к клеточным стенкам *S. aureus* и *B. anthracis* способствовать захвату гема гемоглобина с дальнейшей его передачей от геморецепторов к мембранному транспортному комплексу с дальнейшим перемещением в клетку. Ферменты класса В, в отличие от Sa-SrtA, распознают сигнал сортировки NP(Q/K)(T/S)(N/G/S)(D/A), кото-

рый по строению отличается от канонического мотива LPXTG. Установлено, что Sa-SrtB играет значительную роль в развитии персистирующих инфекций, но при этом в меньшей степени обуславливает вирулентность, чем ферменты класса А. Доказано присутствие Sa-SrtB в клетках *S. aureus*, *C. perfringens*, *C. difficile* и *E. faecalis* [37, 40]. Известно, что фермент класса D (Ba-SrtC) принимает участие в прикреплении двух белков к клеточной стенке – BasH и BasI, на предспору и к фрагменту диаминопимелиновой кислоты пептидогликана соответственно. Ингибирование этого фермента снижает эффективность спорообразования в условиях ограничения кислорода. Сортазы класса E (Cd-SrtF) в *C. diphtheriae* участвуют в присоединении собранных пилей к клеточной стенке, а также опосредуют образование воздушных гиф [41, 42].

Изучена роль фермента ароматазы в качестве объекта воздействия веществ, проявляющих антимикробное действие. Ароматаза представляет собой белковый редокс-комплекс, функционирующий в сопряжении с никотинамидаденин динуклеотидфосфат-зависимой редуктазой. Фермент катализирует превращение андрогенов в эстрогены (андростендион и тестостерон – в эстрон и эстрадиол соответственно) [43]. Описана классификация ингибиторов фермента ароматазы: ингибиторы I типа взаимодействуют с сайтами связывания субстрата фермента (большинство из них являются андрогенами и, как следствие, обладают гормональной активностью); ингиби-

Рис. 4. Основной механизм устойчивости к антибиотикам у бактерий MRSA [51].

торы II типа обратимо взаимодействуют с гемовой частью протетической группы цитохром P450-зависимой монооксигеназы (СУР 450) молекулы ароматазы. Структура ингибиторов II типа, как правило, содержит гетероатомы в составе таких гетероциклических систем, как имидазол и триазол, что позволяет им связываться за счет образования координационной связи с железом гема. Ингибиторы ароматазы также подразделяются по химическому составу на стероидные и нестероидные соединения [44, 45].

Клеточная стенка патогена является первым барьером, с которым сталкивается антимикробный агент. Пенициллин-связывающий белок (РВР) также может быть рассмотрен в качестве мишени для веществ, проявляющих противомикробный эффект. Известно, что РВР катализируют заключительные стадии синтеза пептидогликана клеточной стенки [46]. Описано его участие в полимеризации гликановой цепи (трансгликозилировании) и перекрестном связывании гликановых цепей (транспептидации), в некоторых случаях — гидролизации пептидной связи, соединяющей две нити гликана (эндопептидации) [46, 47]. Установлено, что в их структуру входят цитоплазматический хвост, трансмембранный якорь и два домена, соединенные линкером, расположенным на внешней поверхности цитоплазматической мембраны, где происходит синтез пептидогликана. В зависимости от структуры и каталитической активности их N-концевого домена, они принадлежат к различным классам — А, В и С, — проявляющим транспептидазную, трансгликозилазную и карбоксипептидазную активность. В классе А N-концевой домен отвечает за их гликозилтрансферазную активность, катализи-

руя удлинение не сшитых гликановых цепей, тогда как в классе В он играет роль в клеточном морфогенезе, взаимодействуя с другими вовлеченными в клеточный цикл белками. А С-концевой пенициллин-связывающий (РВ) домен обоих классов характеризуется транспептидазной активностью, принимая участие в перекрестном связывании пептидов между двумя соседними гликановыми цепями [47, 48].

Пенициллин-связывающие белки могут быть подразделены на подклассы для каждого вида бактерий. Известно, что в клетках *S. aureus* присутствует пять видов РВР, различающихся по размеру молекулы и проявляющих транспептидазную активность: РВР1, РВР2, РВР3, РВР3' и РВР4. Сходство выполняемых функций РВР позволяет их соотносить для различных представителей бактериальной микрофлоры. Например, действие РВР2 *S. aureus* аналогично РВР класса А *E. coli* (РВР1а) [46, 49]. Важность РВР2 обусловлена его участием в процессах роста и поддержания выживания бактерии в присутствии антибактериальных веществ: MRSA и *S. aureus* в присутствии бета-лактамовых антибиотиков (рис. 4) [50, 51].

Доказано, что реакции карбоксипептидирования и транспептидирования, катализируемые РВР, протекают в 3 стадии: обратимое образование комплекса между ферментом и пентапептидом пептидогликана [L-Ala-g-D-Glu-A2pm (или L-Lys)-D-Ala-D-Ala] в результате реакции Анри-Михаэлиса; реакция ацилирования, продуктами которой являются ацил-ферментный интермедиа́т и 2-аминопропановая кислота; процесс гидролитического деацилирования, сопровождающийся образованием либо пептида, имеющего меньшую длину цепи (карбоксипептидирова-

ние), либо продукта с большей молекулярной массой за счет связывания со вторым пептидом пептидогликана поперечными связями (транспептидация) [52, 53]. Воздействие вещества с антимикробным эффектом на одну из стадий может привести к нарушению синтеза пептидогликана и, как следствие, гибели бактериальной клетки.

III. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ МИШЕНЕЙ

III.1. Ингибирующее воздействие на компоненты клеточной стенки

Отличие в строении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов является важным при поиске веществ, проявляющих антимикробный эффект. Наличие наружной оболочки у грамотрицательных патогенов, покрывающей как цитоплазматическую мембрану, так и пептидогликановый слой, и имеющей асимметричное распределение липидов с фосфолипидами и липополисахаридами, является их главной особенностью. Грамположительные бактерии лишены дополнительной мембраны. Важным компонентом их клеточной оболочки являются липотейхоевые кислоты (ЛТК) [54–56]. Доказано, что ЛТК *S. aureus* представляют собой 1,3-полиглицеролфосфат, связанный с гликолипидом, состоящим из β -гентиобиозилдиацилглицерина [глюкозил-(1 $\rightarrow$ 6)-глюкозил-(1 $\rightarrow$ 3)-диацилглицерина]. Доказано, что в основе синтеза ЛТК лежит процесс полимеризации полиглицеролфосфата, катализируемый ЛТК-синтазой (LtaS), которая может выполнять роль внеклеточной мишени при разработке антибактериальных агентов [57, 58]. Миколовые кислоты, также представляющие мишень для противомикробных средств, являются важными компонентами клеточной стенки микобактерий и выполняют роль одного из факторов вирулентности *M. tuberculosis*. Химическое строение веществ этой группы позволяет отнести их к β -гидроксилированным жирным кислотам с разветвленной цепью C_{60} – C_{90} , которые ковалентно связаны с арабиногалактан-пептидогликаном, образуя миколит-арабиногалактан-пептидогликановый комплекс. Показана возможность их связывания с наружной мембраной в виде мономиколатов и димиколатов трегалозы или в виде свободных липидов в микобактериальных биопленках [59, 60]. Установлено, что поликетидсинтаза Pks13 играет критическую роль в биосинтезе миколовой кислоты в *M. tuberculosis* в реакции конденсации типа Кляйзена с образованием α -алкил- β -кетокислот, соединяя ветвь α -алкил жирной кислоты по углероду в положении 26 при участии синтазы FAS-I и участок миколовой кислоты (C48–C64) в присутствии FAS-II [61, 62]. Подавление активности поликетидсинтазы, приводящее к ингибированию син-

теза миколовых кислот, лежит в основе механизма действия веществ, проявляющих противотуберкулезную активность.

Установлено, что вирулентность *M. tuberculosis* также может быть обеспечена посредством биосинтеза пантотената, катализируемого ферментом пантотенатсинтетазой (PS), которую представляется возможным рассматривать в качестве потенциальной мишени для лекарственных средств, обладающих противотуберкулезным действием [62, 63]. Определена кристаллическая структура PS *M. tuberculosis*, ее комплексов с пантотенатом и промежуточным продуктом реакции пантоиладенилатом. Известно, что PS катализирует АТФ-зависимую конденсацию пантотената и β -аланина с образованием пантотената. Его структура представляет собой димер, каждая субъединица которого имеет два домена, связанных друг с другом. Доказано, что фермент прочно связывает АТФ и пантоат в активном центре и приближает карбоксильный кислород пантоата к α -атому фосфора АТФ для прямой нуклеофильной атаки [63]. Связывание β -аланина может происходить только после образования пантоиладенилата внутри полости активного центра, прочное связывание которого подавляет его способность ингибировать PS [64].

Новые возможности для получения антимикробных средств открываются при рассмотрении их в качестве агентов, воздействующих на ацетил-КоА-карбоксилазу, катализирующую процесс биосинтеза длинноцепочечных жирных кислот с образованием малонил-КоА по двухстадийному механизму реакции [64, 65]. Известно, что ацетил-КоА-карбоксилаза *E. coli* состоит из трех субъединиц, проявляющих различные функциональные свойства, одной из которых является биотинкарбоксилаза, принимающая участие при протекании первой полуреакции – АТФ-зависимого карбоксилирования 1-атома биотина с образованием карбоксибиотина. Карбокситрансфераза – вторая субъединица – ответственна за перенос карбоксильной группы биотина на ацетил-КоА, тогда как третий компонент ацетил-КоА – карбоксилаза – является белком-носителем биотинкарбоксила, содержащего биотин, ковалентно связанный с азотом лизинового остатка [65].

Показано, что жирные кислоты (ЖК) и их метаболиты являются не только основными структурными составляющими клетки, но и модуляторами множества сигналов путей трансдукции, вызванных окружающей средой. Показана способность ЖК, связанных с белками регуляторных систем, оказывать влияние на клеточный метаболизм и сигнальные системы, а также взаимодействовать с различными факторами транскрипции, влияя на экспрессию генов и т.д. [66].

III.2. Блокирование системы передачи сигналов патогена

Перспективным направлением поиска антимикробных веществ на сегодняшний день является изучение регуляторных белков, воспринимающих сигналы из окружающей среды. Примером таких соединений является циклический аденозинмонофосфат, накопленный в условиях низкой доступности глюкозы, – регулятор поглощения железа. Исследована двухкомпонентная система передачи сигналов (TCS) в клетках патогенных микроорганизмов [67]. Установлено, что TCS включает в качестве структурных компонентов два типа белков: трансмембранный белок – сенсорную гистидинкиназу и регулятор ответа. Показано, что восприятие внешних сигналов (изменение уровня питательных веществ, осмотического давления, pH, окислительно-восстановительного потенциала, действие антимикробных веществ), а также участие в реакции фосфорилирования за счет аминокислотного остатка гистидина в ответ на эти воздействия, составляет основу функционирования первого компонента TCS. Белковый регулятор ответа, предоставляя для связывания фосфатной группы фосфорилированного остатка гистидина киназы фрагмент аспартата, и, как следствие, претерпевающий конформационное изменение, опосредует связывание домена белковой молекулы с участком ДНК, изменяя профили экспрессии генов [67, 68]. Механизм работы TCS основан на реакции фосфорилирования остатка гистидина в сенсорной киназе, представляющей собой трансмембранный белок, который проявляет аутофосфорилирующую и фосфотрансферную активность, с последующим переносом фосфатной группы на остаток аспартата в белковой молекуле регулятора ответа, вследствие чего происходит его конформационное изменение и связывание димера домена с участком ДНК-мишени, примыкающим к промотору. Показано, что фермент киназа принимает участие в образовании биопленок, а также обеспечивает кислотоустойчивость бактерий. Доказана роль TCS в скоординированной экспрессии факторов вирулентности и, в некоторых случаях, жизнеспособности и роста бактерий [69, 70]. Показано, что ингибирование активности регулятора ответа способствует блокированию работы системы передачи сигналов, вызывая нарушение жизнедеятельности патогена [67].

Изучено строение TCS различных патогенных микроорганизмов. Известно, что у *S. enterica* двухкомпонентная система PhoP/PhoQ включает трансмембранный сенсор – гистидинкиназу (PhoQ) – и регулятор цитоплазматического ответа (PhoP). Установлено, что одной из функций системы является контроль механизма проникновения бактерий в эпителиальные клетки ки-

шечника. PhoP-модулированные гены определяют внутриклеточную выживаемость и способность к пролиферации [71]. Двойная система передачи сигналов *B. subtilis* u *S. aureus* WalK/WalR является основной системой регуляции метаболизма клеточной стенки и необходима для обеспечения жизнеспособности клеток [71, 72].

Знание основных факторов вирулентности патогенных микроорганизмов раскрывает новые возможности для моделирования структуры антибактериальных веществ. Адгезины, участвующие в прикреплении микробных клеток к специфическим поверхностям, по химической структуре могут быть разделены на фимбриальные (фимбрии, пили) и афимбриальные. Большинство патогенов экспрессируют несколько различных типов адгезинов [57, 70]. Доказано, что структура и функция адгезинов зависят от строения клеточной стенки возбудителя. Оболочка грамположительных бактерий содержит толстый сетчатый слой пептидогликана, состоящий из N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенные пептидными мостиками. Адгезины прикрепляются непосредственно к внешнему слою пептидогликана. Пептидогликан грамотрицательных бактерий, отделенный периплазматическим пространством от наружной мембраны, имеет меньшую толщину [59, 60]. Адгезины в таких микроорганизмах могут быть как компонентами ЛПС (липополисахаридов), так и присоединяться к наружной или внутренней клеточной мембране, пронизывая слой пептидогликана, периплазматическое пространство и наружную мембрану [59, 70]. Различаясь по строению клеточной стенки, бактерии не в одинаковой степени подвергаются действию антимикробных агентов, химическая структура которых, вероятно, должна отличаться как по полярности, так и пространственному строению [59].

Необходимость поиска веществ, проявляющих активность в отношении таких патогенов, как *S. pneumoniae*, *N. meningitidis* и *H. influenzae* и др., часто обусловлена наличием капсулы (гликокаликса), окружающей внешнюю мембрану. Показано, что ее присутствие способствует подавлению фагоцитоза, блокированию действия адгезинов [60, 61].

III.3. Нарушение межклеточной коммуникации бактерий

Способность бактерий образовывать биопленки и использовать специфический секретлируемый сигнал (“чувство кворума”) (QS) для регуляции межклеточной коммуникации в ответ на изменение плотности клеток окружающего микробного сообщества приводит к повышению устойчивости патогенных штаммов к действию противомикробных веществ [73, 74]. Бактерии выделяют

различные сигнальные молекулы: N-ацилгомосериновые лактоны (AHL), секретируемые грамотрицательными бактериями; белки, взаимодействующие с арильным углеводородным рецептором (AIP), секретируемые грамположительными микроорганизмами; аутоиндукторы (AI-2), вещества эндогенного происхождения, секретируемые и грамотрицательными, и грамположительными патогенами [73, 75].

Показано, что AHL (AI-1), выполняющие роль AI грамотрицательных бактерий, синтезирующих их при участии фермента LuxI из S-аденозилметионина (SAM), сходны у различных патогенов по наличию лактонного цикла и различаются строением ацильных радикалов, содержащих 4–12 (в отдельных случаях 14–18) углеродных атомов [75]. Обоснована способность AHL свободно диффундировать через бактериальную мембрану посредством определенных каналов и накапливаться в окружающей среде. Попадание в клетку и объединение с внутриклеточным регуляторным белком (LuxR) происходит при достижении концентрации AHL в окружающей среде определенного значения, вследствие чего происходит экспрессия специфического для бактериальной клетки функционального гена. Отмечается, что размер ацильного заместителя и наличие функциональной группы у атома C3 определяют специфичность связывания AI-1 с LuxR [76]. Определена коммуникационная функция AHL, направленная на реализацию взаимосвязи как между бактериями одного вида, так и разными микроорганизмами [75].

Сигнальными молекулами грамположительных бактерий являются двухкомпонентные белки (AI-2), которые передают сигнал в клетку по механизму фосфорилирования и дефосфорилирования, а также регулируют экспрессию родственных генов в клетке, тем самым контролируя продукцию патогенетических факторов и токсинов, образование поверхностных пленок, а также внутри- и межвидовые взаимодействия бактерий. Предшественником AI-2 является 4,5-дигидрокси-2,3-пентандион (DPD), который является побочным продуктом метаболизма SAM, широко представленного в различных микроорганизмах. Известно, что AI-2 представлен у бактерий одного вида двумя формами: (2S,4S)-2-метил-2,3,4,5-тетрагидроокситетрагидрофураном (S-THMF) или его боратым диэфиром и (2R,4S)-2-метил-2,3,4,5-тетрагидроокситетрагидрофураном (R-THMF) или его фосфатным эфиром [74–76]. Показано, что AI-2 оказывают регуляторное влияние на бактериальную клетку за счет двух сигнальных систем: LuxP, который, связываясь с S-THMF-боратом, способствует запуску каскада фосфорилирования, активирующего гистидинкиназу и действие регулятора ответа; системы, включающей транспортер (Lsr), переносящий AI-2 внутрь клетки с последу-

ющей его модификацией и активацией им регуляторных белков, контролирующих экспрессию бактериальных генов [75].

Одним из эффективных направлений воздействия антибактериального агента на биопленку является подавление процесса ее формирования либо на этапе адгезии или сорбции микроорганизмов к поверхности субстрата, либо на стадии образования патогенами внеклеточных полимеров с последующим возникновением микроколоний и их слиянием [77]. Признаком зрелости биопленки является продукция входящих в ее состав микроорганизмов, производящих экзополисахариды, составляющие до 80% матрикса. Амилоидоподобные белки, белки вар-семейства, лектины, аутопереносчики также являются основными компонентами биопленочного матрикса, опосредуя межклеточные контакты и адгезию [78]. Понимание важной роли QS в контроле вирулентности бактерий дает основание рассматривать ингибиторы “кворум-сигнала” в качестве лекарственных средств, действие которых направлено на подавление патогенности микроорганизмов [77, 78].

Оценена роль циклооксигеназы (ЦОГ), катализирующей превращение арахидоновой кислоты в простагландин H₂ (PGH₂), в качестве мишени для веществ, характеризующихся противомикробным эффектом. Показано существование веществ, действие которых на ЦОГ приводит к усилению киллерной активности макрофагов, фагоцитирующих патогенный микроорганизм [74, 79]. Известно, что ЦОГ представляет собой фермент, принимающий участие в синтезе простаноидов, включая тромбоксан, и простагландинов [79]. Установлено, что циклооксигеназа существует в виде двух изоформ – ЦОГ-1 и ЦОГ-2, – отличающихся по молекулярной массе. Описана экспрессия ЦОГ-2 макрофагами [78, 79]. Рассмотрение воспаления как необходимой составляющей иммунного ответа, который может предотвратить возникновение инфекционного процесса за счет продукции провоспалительных цитокинов и образования медиаторов воспаления в ответ на продукты жизнедеятельности микробной клетки, позволяет приравнять соединения “модуляторы макрофагов” к веществам, проявляющим антимикробный эффект [79].

Представление об основных способах подавления вирулентности патогена, химической природе антимикробного агента служит основой для получения новых лекарственных средств, характеризующихся направленностью действия на определенную мишень и, как следствие, проявляющих выраженную активность.

Среди принципов, лежащих в основе стратегии получения новых лекарств, нашли широкое применение такие, как химическая модификация молекул известных природных и синтетических

веществ, учитывающая взаимосвязь “структура–активность”, а также усовершенствование молекулы соединения-лидера методом биоизостерических перемещений.

IV. ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНАЗОЛИНОНА – АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ

IV.1. Модификация молекулы производных хиначолинона как способ получения новых антимикробных средств

Известно, что гетероциклические молекулы занимают ведущее место среди множества органических соединений, составляя основу для разработки клинически важных антибиотиков, таких как пенициллины, цефалоспорины и тенамицины.

Весьма перспективными, с точки зрения реакционной способности, устойчивости химических процессов и высокой фармакологической активности, являются вещества, относящиеся к классу хиначолинонов – производные хиначолина (1), представляющие собой органические соединения, в основе структуры которых находится конденсированная система, состоящая из бензольного и пиримидинового циклов:

Производные хиначолинона можно классифицировать по различным признакам: по количеству заместителей (дизамещенные, тризамещенные, тетразамещенные); по положению карбонильной (или оксогруппы) (2(1H)-хиначолиноны (2), 4(3H)-хиначолиноны (3), 2,4(1H,3H)-хиначолиноны (4); по способу замещения (2-замещенные-4(3H)-хиначолиноны, 3-замещенные-4(3H)-хиначолиноны, 2,3-дизамещенные-4(3H)-хиначолиноны, 2,4-дизамещенные-4(3H)-хиначолиноны). Установлено, что наиболее распространены 4(3H)-хиначолиноны [80].

Получение веществ, относящихся к группе производных хиначолинона, проявляющих антимикробную активность, а также являющихся исходными веществами для синтеза соединений с противомикробным эффектом, стало наиболее существенным и прогрессивным событием в период возрастания числа опасных для жизни инфекционных заболеваний, вызываемых бактери-

ями с множественной лекарственной устойчивостью [81].

Дизайн молекул, содержащих ядро хиначолинона, предполагает изменение степени антимикробного эффекта за счет преобразования структуры путем введения различных заместителей. Установлено, что галогенирование хиначолинона в положении 6 и замещение атома водорода в положении 3 фенильным заместителем способствуют повышению антибактериальной активности. Обоснована роль фтора в качестве заместителя хиначолинонового цикла для улучшения растворимости, селективности, биодоступности и метаболической стабильности [81, 82]. Показано, что введение различных липофильных фрагментов в положение 3 хиначолинонового ядра способствует повышению степени противомикробного действия веществ. Обосновано усиление антимикробного эффекта при замещении положения 2 метильной, амино- или тиольной группами [82].

IV.2. Изучение антибактериальной активности новых производных хиначолин-4(3H)-она

Работы по синтезу и изучению антимикробной активности хиначолиноновых производных (5) позволили установить проявление 3-[2-(1-нафтил)-2-оксоэтил]-6-бромхиначолин-4(3H)-оном (VMA-13-06) выраженного бактерицидного действия в отношении *S. aureus*, *St. pyogenes*, *E. coli* и *K. pneumonia* [83, 84].

Доказано, что производные 3-(2-бензилокси-2-оксоэтил)хиначолин-4(3H)-он и 3-[2-(1-нафтил)-2-оксоэтил]хиначолин-4(3H)-он, содержащие α-нафтильный и бензилокси-радикалы, обуславливающие высокую степень гидрофобности, оказывают противомикробную активность в отношении *S. aureus*, *K. pneumonia*, *G. freundii* [83].

R¹ = H, низший алкил, Ph

R² = фрагмент алифатического или ароматического кетона, амида, сложного эфира

R³ = H, Cl, Br

Использование общих принципов и стратегий, лежащих в основе синтеза веществ хиначолиновой природы, а именно, карбонильных производных хиначолин-4(3H)-она (6), позволило создать вещества, для которых был проведен первичный микробиологический скрининг антимик-

Таблица 1. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК, мкг мл⁻¹) новых производных хиназолинона [85, 86]

Соединение	<i>S. pneumoniae</i>		<i>S. aureus</i>		<i>E. coli</i>		<i>K. pneumoniae</i>	
	МИК ₅₀ ^a	МИК ₁₀₀ ^b	МИК ₅₀	МИК ₁₀₀	МИК ₅₀	МИК ₁₀₀	МИК ₅₀	МИК ₁₀₀
VMA-10-10	8	—	—	—	4	32	4	—
VMA-10-18	16	—	—	16	4	—	4	—
VMA-10-21	—	64	128	—	32	—	4	—
VMA-13-05	—	16	—	32	4	16	—	0.25
VMA-17-01	8	64	8	32	32	—	2	—
VMA-17-04	4	16	4	16	—	—	2	—
VMA-13-17	4	32	4	64	8	—	8	—

^a МИК₅₀ – подавление роста микробной культуры на 50%. ^b МИК₁₀₀ – подавление роста микробной культуры на 100%.

робной активности с определением минимальной ингибирующей концентрации (табл. 1) [85].

- R¹ = H, Br
- R² = H, Me
- R³ = Ph, 1-C₁₀H₇, NHPh, NH(4-PhOMe), NH(4-PhNMe₂), NHC(NH)NH₂, 4-Ph-пиперазин-1-ил

Показано, что соединение, содержащее в качестве R² и R³ метильную группу и аминифенильный радикал соответственно (VMA-17-04), активно в отношении *S. aureus*, проявляя бактериостатический эффект. Установлено, что антибактериальный эффект вещества в α-нафтильным заместителем (R³ = VMA-13-05) выражен в меньшей степени. Предполагается, что, являясь более полярным, VMA-17-04 за счет электронодонорного центра – атома азота амидной группы, связанной с хиназолиноновой составляющей и бензольным кольцом, – характеризуется большей аффинностью связывания с белковой молекулой ДНК-гиразы. Описано проявление VMA-13-05 бактериостатического эффекта в отношении *S. pneumoniae*, что, вероятно, является следствием высокой липофильности вещества, способного легко проникать через клеточную мембрану [85]. Доказана бактерицидная активность 3-[2-(1-нафтил)-2-оксоэтил]-4(3H)-хиназолинона (VMA-13-05), а также 3-[2-[(4-диметиламинофенил)амино]-2-оксоэтил]хиназолин-4(3H)-она (VMA-10-10), содержащего диметиламино-замещенный фенильный радикал, в отношении *E. coli* и *K. pneumoniae* (табл. 1). Вероятно, одним из возможных спосо-

бов воздействия на клетку патогена является блокирование работы “эффлюксной системы оттока” данными соединениями [86]. Методами математического моделирования изучена способность 3-(1-фениламино-1-оксо-2-пропил)-хиназолин-4(3H)-она (VMA-17-04) вступать во взаимодействие с треониновым остатком, расположенным в активном сайте ЛТК-синтазы *S. aureus*, принимающей участие в синтезе липотейхоевой кислоты, что может свидетельствовать об одном из вариантов механизма нарушения вирулентности данного патогена [85–87].

IV.2. Производные хиназолинона, оказывающие воздействие на “эффлюксный насос” патогена

Изучение влияния соединений, относящихся к хиназолинонам, на систему оттока LfrA у патогена *M. smegmatis* позволило создать представление о механизме действия производных 11H-пиридо[2,1-b]хиназолин-11-она (7) (МИК > 4 мкг мл⁻¹), в основе которого лежит взаимодействие веществ с аминокислотными остатками валина, серина, лейцина, пролина, тирозина и аспарагина белковой молекулы, образующей “эффлюксный насос”. Обоснована возможность использования хиназолиноновых производных в комбинации с бромидом этидия и норфлоксацином. Показано, что связывание 11H-пиридо[2,1-b]хиназолин-11-она с “эффлюксной помпой” способствует накоплению антимикробных агентов внутри клетки [1, 88].

- R¹ = H, F, Cl, Br
- R² = H, F, Cl, Me, Ph

IV.3. Хиназолиноны, воздействующие на компоненты клеточной стенки патогена

Рассмотрение редуктазы белка-носителя еноил-ацила (InhA) *M. tuberculosis*, катализирующей НАДН-зависимое восстановление *транс*-двойной связи между положениями С2 и С3 жирных ацильных субстратов, являющейся членом микобактериальной системы FAS-II, позволило сделать вывод о возможности 3-замещенных 2-метил-3*H*- и 2-фенил-3*H*-хиназолин-4-онов оказывать влияние на биосинтез миколовых кислот в клеточной мембране патогена [89].

Установлена значительная аффинность связывания соединений 2-фенильного ряда хиназолинонов, по сравнению с 2-метильными производными, по причине большей гидрофобности ароматического фрагмента. Показано, что присутствие амидо-, тиоамидо- и гуанидиногруппы в положении 3 ядра хиназолинона способствует проявлению противотуберкулезной активности веществом (8, 9). Введение тиоамидного или гуанидинового фрагмента способствует повышению антимикобактериальной активности хиназолинонов [89].

Способность ингибировать РВР2а за счет связывания с его аллостерическим сайтом, приводящим к конформационным изменениям и открытию активного сайта фермента, лежит в основе механизма антимикробного действия в отношении *S. aureus* 3-(5-карбоксит-2-фторфенил)-2-(4-цианостирил)хиназолин-4(3*H*)-она (10) (МИК = 0.5 мг мл⁻¹) и создает возможность использования его в комбинации с пиперациллином и тазобактамом, не проявляющими активность в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) [90].

Описан механизм действия тройной системы хиназолинона с противомикробными агентами. Ос-

новными стадиями ее функционирования являются ингибирование β-лактамазы тазобактамом, способствующее предотвращению гидролиза одной из молекул пиперациллина; связывание хиназолинонового производного с аллостерическим сайтом РВР2а, вследствие чего осуществляется запуск аллостерического ответа, который приводит к открытию активного центра; взаимодействие непрореагировавшего пиперациллина с белком. Конечным результатом перечисленных процессов является нарушение биосинтеза клеточной стенки, приводящее к ее гибели, что свидетельствует о проявлении бактерицидного действия комбинации перечисленных веществ [46, 91].

Установлена противомикробная активность 3-(3-карбокситфенил)-2-(4-цианостирил)хиназолин-4(3*H*)-она (11), сходная с активностью линезолида и ванкомицина в отношении MRSA (МИК > 128 мг мл⁻¹), которая обусловлена способностью связываться с РВР2а. Ингибирование веществом пенициллин-связывающего белка также лежит в основе механизма фармакологического действия вещества на *S. aureus* и делает возможным его применение при лечении инфекций, вызванных данным патогеном [91].

Аффинность связывания хиназолинонового фрагмента с активным сайтом РВР2а характеризуется высокой степенью проявления, что объясняется образованием двух водородных связей между карбонильной группой соединения 11 и аммониевыми группами (NH₄⁺) остатков аспарагина и лизина пенициллин-связывающего белка [92].

Доказано, что при увеличении количества функциональных центров в молекуле, образующих водородную связь с РВР2а, степень противомикробного действия повышается. Участие атома фтора фторбензольного цикла, связанного с хиназолиноновым ядром через фрагмент двойной связи соединения 12, в дополнительном водородном взаимодействии с аминогруппами остатков лизина (Lys273 и Lys316) белковой молекулы РВР2а повышает прочность промежуточного комплекса “хиназолинон–белок”, стабилизированного связями между карбонильной группой и атомом йода хиназолинонового фрагмента с 2,6-диаминогексановыми кислотами (Lys146 и Lys273) [92].

Описано взаимодействие молекул хиначолинона и пенициллин-связывающего белка, которое осуществляется посредством водородных связей между различными участками мишени, например: карбонильной группой антимикробного агента **13** и аминогруппами глутамина и лизина (Glu294 и Lys316), гидроксила карбоксильной группы и карбоксилатным центром глутамина (Glu294), карбонильной группой бензойной кислоты и аминогруппой лизина (Lys273) [93].

Способность хиначолинового фрагмента вступать во взаимодействие с РВР дает возможность рассматривать его в качестве фармакофора, обуславливающего антимикробную активность и, как следствие, использовать при получении новых производных при введении его в структуру веществ с доказанной активностью. Установлено, что замена водорода в пиперазиновом цикле в положении С7 хинолоновых производных — ципрофлоксацина и сарафлоксацина, производными 2-метилхиначолин-4(3H)-она — позволяет получить

соединения, проявляющие антимикробный эффект в отношении MRSA, *S. aureus*, *E. faecalis* [89].

Изучена возможность образования связи между карбоксильными группами миколиновой кислоты, присутствующей в клеточной мембране микобактерий, с хиначолиновым ядром фуллерен-хиначолинового конъюгата, характеризующегося ярко выраженной противомикробной активностью в отношении *M. tuberculosis* (МИК 1.562–3.125 мкг мл⁻¹) [94]. Наличие в нем акцепторов электронов — атомов водорода — способствует его взаимодействию с лизинным, глутаминовым, аспарагиновым и аргининовым аминокислотными остатками (Lys66, Glu122, Asp123, Asp126, Lys154, Asp182 и Arg188) активного сайта InhA. При замещении хиначолинового цикла фенильным его взаимодействие с HGPR *M. tuberculosis* осуществляется за счет гидрофобного взаимодействия ароматического фрагмента фуллеренового конъюгата с фенилаланиновыми остатками (Phe175) гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы.

Роль фуллеренового фрагмента заключается в ориентировании аминокислотных остатков алифатической и ароматической природы активного сайта и подготовке их к оптимальному взаимодействию с производным хиначолинона [94]. Показано, что моно- и дибромзамещенные производные хиначолинона проявляют более выраженную активность, чем незамещенные. Вероятно, это связано с увеличением липофильности молекулы, которое влечет облегчение прохождения микобактериальной клеточной мембраны лекарственным веществом [95].

Большой интерес представляют комплексные производные хиначолинонов, связанных с аминокислотами — тирозином и фенилаланином (**14**), — координированные ионами Cu²⁺ или Co²⁺, проявляющие выраженное противомикробное действие в отношении *S. aureus*, *B. subtilis*, *Salmonella* (МИК 50 мкг мл⁻¹) и *Shigella* (МИК 100 мкг мл⁻¹), по сравнению с индивидуальными соединениями (100–200 мкг мл⁻¹) [96].

Проанализировано связывание аминокислотных комплексных соединений хиназолинона с рецептором белка связывания ампициллина (1W2N). Результаты молекулярного докинга свидетельствуют о высокой аффинности связывания производных хиназолинона с 1W2N. Присутствие остатков аминокислот в молекуле способствует проявлению соединением выраженной активности вследствие повышения гидрофильности. Показано, что комплексобразователь не оказывает влияния на аффинность связывания с рецептором, однако обуславливает участие вещества в физиологических процессах [96].

IV.3. Антимикробный эффект производных хиназолинона, опосредованный нарушением репликации бактериальной ДНК

Проявление антибактериальной активности в отношении *B. subtilis* производными 2,3-дизамещенных производных 4(3*H*)-хиназолинона (**15**), содержащими в положении 3 фенильные, гетероциклические и различные алифатические заместители, за счет ингибирования бактериальной ДНК-гиразы, участвующей в процессе репликации бактериальной ДНК, способствует гибели патогена [17]. Доказано, что введение заместителя в положении 2 и 6 в структуре хиназолинона существенно для проявления веществом антимикробной активности. Отмечается, что замещение водорода на ацильную группу в NH-фенилгидразиновом фрагменте, связанном с фенильным заместителем, способствует увеличению степени фармакологического эффекта [18]. Описано проявление исследованными соединениями ярко выраженного противогрибкового эффекта в отношении *C. albicans*, *A. niger* и *A. flavus* [90].

15

R = Me, 1-Pr, Ph, 4-ClPh, 4-NO₂Ph, 3,5-(NO₂)₂Ph, Bn

16

R¹ = H, Cl, Br, OMe
R² = H, Cl

17

Показана способность производных, содержащих метильный и пропильный заместители, подавлять жизнедеятельность перечисленных патогенов в концентрациях 64 и 32 мкг мл⁻¹ соответственно. Соединения **15**, где R = Ph или ClPh, при таких же МИК обладают фармакологическим действием в отношении *C. albicans* и *A. flavus*, тогда как соединение с R = NO₂Ph – при МИК 512 мкг мл⁻¹. Хианзолинон с R = 3,5-(NO₂)₂Ph в разведениях 128 и 512 мкг мл⁻¹ активен в отношении *A. niger*, *C. albicans* и *A. flavus* [90].

Изучено взаимодействие хианзолиноновых производных ципрофлоксацина (**16**) и сарафлоксацина (**17**) с ДНК-гиразой, являющейся для них мишенью. Описано связывание производных хианзолинона с ковалентными комплексами топоизомеразы-ДНК II типа, при котором образуется тройной комплекс, состоящий из хианзолинона, бактериальной топоизомеразы II типа и расщепленной ДНК [93]. Вследствие такого взаимодействия происходит ингибирование процесса репликации ДНК и/или механизма транскрипции по причине возникновения двухцепочечных разрывов цепи нуклеиновой кислоты [17].

Показано, что при R¹ = OMe повышается растворимость в воде производного **16**, полученного на основе ципрофлоксацина, и усилению, по сравнению с исходными соединениями, противомикробного действия в отношении MRSA, *S. aureus*, *E. faecalis* [93]. Литературные данные по МИК позволяют провести сравнение степени фармакологического эффекта соединений: метокси-производное **16** в разведении 0.016 мг мл⁻¹ способно подавлять жизнедеятельность MRSA, *S. aureus* и 0.5 мг мл⁻¹ – *E. faecalis*; соединение **17** оказывает противомикробное действие в отношении обозначенных патогенов при высоких концентрациях – 0.125 и 2 мг мл⁻¹ соответственно. Вещества, замещенные атомом хлора, проявляют выраженную активность при МИК 0.25 мг мл⁻¹ в отношении MRSA, *S. aureus* и 64, 8 и 4 мг мл⁻¹ – *E. faecalis* [93]. Наличие в молекулах полярных функциональных групп в сочетании с объемными гидрофобными фрагментами определяет тенденцию к умеренному проникновению веществ через клеточные мембраны [97–99].

Значения энергии связи между соединением, содержащим в качестве R¹ метокси-группу, и активным сайтом фермента свидетельствуют о большей степени связывания хиназолинового производного с белковой молекулой, по сравнению с ципрофлоксацином [98]. Установлено образование водородной связи между кислородом карбоксильной группы, выполняющим роль акцептора электронов, с аминокислотным остатком серина (Ser1084) фермента. Роль донора электронов в межмолекулярном взаимодействии выполняет атом азота пиперазинового цикла антибактериального агента, который связывается с аргинином ДНК-гиразы [93].

Охарактеризована антимикробная активность производных 3-(2-аминоэтил)хиназолин-2,4(1*H*,3*H*)-диона (**18**) в отношении *A. baumannii* (IC₅₀ > 50 для соединений с R = H, OMe; IC₅₀ 17.6 ± 0.8 у производного с R = Me), содержащих первичные аминогруппы, соединенные с ядром хиназолинона через две метиленовые группы, которые могут взаимодействовать с субъединицами SугА или РагС ДНК-гиразы. Гибкость заместителя делает возможным образование π-стэкинг-взаимодействий с соседними основаниями ДНК в тройном комплексе с ДНК-гиразой, что способствует увеличению степени антибактериального эффекта вещества [100].

18

R = H, Me, OMe

Дизайн молекул с антимикробным действием на основе 7-хлорхиназолинона, предполагающий введение в молекулу исходного вещества замещенной аминогруппы, привел к получению замещенных 2-фенил-3-метиламино-(3*H*)-хиназолин-4-онов (**19**), оказывающих антибактериальное действие на *S. aureus* и *E. coli*, с МИК у вещества, где R = NMe₂, 25 и 50 мг мл⁻¹ соответственно [101, 102].

19

R = NMe₂, NEt₂, N(CH₂)₅, NHCH₂CH₂OH, NHBn, NHPh, NH(4-PhOH), NH(4-PhCl), NH(2-PhNO₂), NH(4-PhOMe), NPh₂

Доказано, что вещество, содержащее в качестве R аминогруппу с двумя метильными заместителями, взаимодействует с ДНК-гиразой с образованием трех водородных связей. Присутствие атома галогена как заместителя в бензольном кольце или функциональных групп — доноров электронов — обуславливает полярность молекулы и облегчает транспорт соединения через гематоэнцефалический барьер [102].

Доказанная способность бензофурановых производных хиназолинона проявлять широкий спектр фармакологической активности позволяет их рассматривать в качестве кандидатов на создание конденсированной системы с хиназолиновым циклом [26]. Известно, что антимикробное действие таких соединений обусловлено способностью бензофуранового гетероцикла образовывать водородные связи с аминокислотными остатками треонина (Thr170), аспарагина (Asn52), аланина (Ala53), изолейцина (Ile84) и глутамина (Glu48) ДНК-гиразы [103].

Изучена антимикробная активность производных пирроло[1,2-*a*]хиназолина, обладающих потенциальной способностью ингибировать ДНК-гиразу *M. tuberculosis* [104].

Установлена антимикробная активность производных хиназолинона, замещенных остатками мочевины и сульфаниламидных фрагментов (**20**). Показано, что интеграция сульфаниламидов с хиназолин-4(3*H*)-онами позволяет получить вещества, антибактериальный эффект которых значительно превосходит фармакологическое действие исходных производных. Доказана способность замещенных хиназолинонов подавлять активность ДНК-гиразы *S. aureus* [105].

20

R = 4-PhEt, 4-PhOMe, 4-PhOEt, 3,5-Ph(OMe)₂, 2-Me-4-NO₂Ph, 2-Me-6-NO₂Ph, 2,4-Ph(NO₂)₂

Охарактеризована степень противомикробного эффекта производных соединения **20** в отношении *B. subtilis* (МИК 1.25–2.5 мкг мл⁻¹), *S. aureus* (МИК 2.5–7.5 мкг мл⁻¹), *E. coli* (МИК 5–15.63 мкг мл⁻¹), *P. aeruginosa* (МИК 2.5–20 мкг мл⁻¹) и MRSA (МИК 5–15.63 мкг мл⁻¹) [105]. Методами молекулярного докинга установлено, что соединение, содержащее в качестве радикала нитрофенильный фрагмент, проявляет выраженную активность в отношении грамположительных (*B. subtilis* и *S. aureus*) и грамотрицательных бакте-

рий (*E. coli* и *P. aeruginosa*), превосходящую фармакологический эффект тетрациклина, ципрофлоксацина, ванкомицина и амфотерицина В [105]. Присутствие в веществах незамещенного фенильного цикла, а также в случае введения в него алкильного остатка или простой эфирной группы, способствует повышению степени антимикробного действия на грамположительные патогены, что, вероятно, связано с отсутствием у них дополнительной мембраны и легкостью проникновения соединений через липофильный слой в клетку (при наличии гидрофобных фрагментов в их молекуле). Показано, что соединения с нитрофенильным заместителем более активны в отношении грамотрицательных бактерий [105]. Описан механизм связывания сульфаниламидхиназолинонового производного с активным сайтом фермента ДНК-гиразы. Осуществляется донорно-акцепторное взаимодействие карбоксильной и сульфамидной групп соединения с Mn^{2+} фермента. Решающее значение для стабилизации сформированного промежуточного комплекса имеет образование водородной связи между хинолиноновым фрагментом и аминокислотными остатками аргинина и серина [105].

Ингибирование суперспирализации в присутствии ДНК-гиразы установлено для производных мочевины – 3-(2-гуанидиноэтил)хинолинон-2,4(1*H*,3*H*)-диона (**21**). Присутствие метильной группы в качестве R обуславливает выраженную активность в отношении *E. coli* ($IC_{50} > 50$ мкМ) [100].

Принимая во внимание сходство 3-(2-гуанидиноэтил)хинолинон-2,4(1*H*,3*H*)-дионов по наличию остатка гуанидина с такими противомикробными средствами, как амбазон, сульфагуанидин, хлоргексидин, можно предполагать, что данный заместитель в этих соединениях выполняет роль фармакофора антимикробной активности.

IV.4. Производные хинолинона, подавляющие признаки вирулентности бактерий

Известно, что одним из механизмов антимикробного действия веществ является снижение способности патогена к адгезии, которое реализуется за счет связывания соединения с ферментом, оказывающим влияние на белки, принимающие участие в прикреплении бактерии к суб-

страту. Показана возможность ингибирования сортазы А патогена *S. aureus* производными 3-бензил-2-(4-хлорфенил)хинолинон-4(3*H*)-она (**22**) [33].

R = Bn, 3,4-(MeO)₂Ph,
CH₂CH₂[3,4-(MeO)₂Ph], 4-PhCH₂COOH

Отмечается, что присутствие в положении 3 бензильного заместителя способствует проявлению веществом антимикробного эффекта в отношении грамотрицательных микроорганизмов [33]. Проведение антимикробного скрининга позволило подтвердить проявление наиболее выраженного, по сравнению с другими производными, противомикробного действия *in vitro* 3-бензил-2-(4-хлорфенил)хинолинон-4(3*H*)-она с МИК 25.6 ± 0.5 , 24.3 ± 0.4 , 30.1 ± 0.6 и 25.1 ± 0.5 мкг мл⁻¹ в отношении *S. aureus*, *B. subtilis*, *P. aeruginosa* и *E. coli* и 18.3 ± 0.6 , 23.1 ± 0.4 и 26.1 ± 0.5 мкг мл⁻¹ в отношении *A. fumigatus*, *S. cerevisiae* и *C. bicans* соответственно [33].

Методами молекулярного докинга установлено, что ингибирующая активность 3-бензил-2-(4-хлорфенил)хинолинон-4(3*H*)-она реализуется за счет образования водородной связи между кислородом хинолинонового фрагмента с аминокислотным остатком аргинина (Arg197) и хлорзамещенного фенильного цикла с гидроксильной группой серина сортазы А. Образовавшийся промежуточный комплекс стабилизируется гидрофобным связыванием бензольного кольца хинолинонового фрагмента и триптофаном белковой молекулы [32, 33].

Воздействие лекарственных веществ на двухкомпонентную систему передачи сигналов (TCS) на сегодняшний день является одним из перспективных направлений получения новых соединений с антимикробным эффектом. Сведения об использовании данной мишени для проявления антибактериального действия производными хинолинона отсутствуют. Однако имеющиеся литературные данные о возможности селективного подавления генов, активирующих сенсорную систему PhoP/PhoQ, а также репрессии сигнальной молекулы PhoQ *S. enterica* хинолиноновыми производными, позволяют предполагать вероятность проявления антимикробной активности хинолинонов по такому же механизму, учитывая общность химической природы гетероциклических систем [106, 107].

Подавление сигналов “кворум-системы” бактерий является еще одним способом воздействия хиназолиноновых соединений на клетки патогена. Установлено, что соединения, содержащие хиназолиновое ядро, способны ингибировать одну из трех QS *P. aeruginosa*: Las, Rhl и Pqs. Известно, что Pqs для сигнализации использует такие вещества, как алкилхинолоны (2-гептилхинолин-4(1*H*)-он) (HHQ) и сигнал хинолона *Pseudomonas* (2-гептил-3-гидрокси-4(1*H*)-хинолон (PQS). Показано, что ингибирование системы Pqs может привести к снижению производства пиоцианина и алкилхинолонов, и, как результат, подавлению вирулентности [108, 109].

Установлено, что связывание хиназолинона с белковой молекулой PqsR одной из систем “кворум-сигнализации”, состоящей из двух субдоменов, осуществляется за счет атома хлора в положении 7 и гидразидной группой с треониновым (Thr265) и лейциновым (Leu207) остатками PqsR.

23

Показано, что 2-нонил-3-амино-7-хлорпроизводное хиназолинона (**23**) оказывает влияние на продуцирование пиоцианина *P. aeruginosa*, а также подавляет процесс образования биопленки микроорганизмом [110].

Исследована способность 6-хлор-3-[(2-пентилтиазол-4-ил)метил]хиназолин-4(3*H*)-она и 6-хлор-3-[(2-гексилтиазол-4-ил)метил]хиназолин-4(3*H*)-она (**24**) также блокировать продукцию регулируемого PqsR фактора вирулентности пиоцианина *P. aeruginosa* (IC₅₀ 13.2 ± 2.73 и 1.0 ± 0.42 мкМ соответственно) [108].

24

R = (CH₂)₄Me, (CH₂)₅Me

Доказано, что присутствие коротких, неразветвленных алкильных цепей в молекуле хиназолинона приводит к потере активности также, как и в случае присоединения гетероатомов к алкильной цепи. Показано отсутствие ингибирующей способности у соединений, содержащих три гетероатома в их боковой цепи, что указывает на отрицательный эффект от увеличения полярности соединения [108]. Методами молекулярного до-

кинга подтверждено образование водородной связи между карбонильной группой хиназолинового ядра и гидроксильной группой треонина (Thr265). Отмечается, что изменение положения атома хлора устраняет возможность образования водородной связи между указанными фрагментами молекул. Охарактеризована роль тиазольного фрагмента в дополнительном связывании с остатком треонина (Thr258) [108].

Разработка методов синтеза веществ хиназолиновой природы, проявляющих антимикробную активность, привела к получению новых производных 4(3*H*)-хиназолинониламинопиримидина (**25**) [111].

25

Ar = 3-PhBr, 2,4,6-Ph(OMe)₃, 4-Ме-тиофен-1-ил

Доказана способность синтезированных соединений, содержащих в структуре 2,4,6-триметоксифенильный и 4-метилтиофенильный заместители, а также ковалентно связанный бром, ингибировать процесс формирования биопленок, образованных MRSA (IC₅₀ 20.7–22.4 мкМ, МИК ~0.5 мкМ) и *M. smegmatis* (IC₅₀ ~15 мкМ). Низкая токсичность производных *in vitro* позволяет рассматривать их в качестве кандидатов для дальнейшего изучения [111].

Установлен ингибирующий эффект хиназолиновых производных бензофурана на протеин-тирозинфосфатазу (mPTPB) *Mycobacterium*, являющуюся одним из факторов вирулентности патогена. Установлено, что антимикробный эффект таких гетероциклических соединений может быть также опосредован ингибированием фермента ароматазы [103].

Показано ингибирование выработки QS-зависимого пигмента виолацеина условно-патогенным возбудителем *S. violaceum* под действием 1-изопропиламино-3,4-дигидропиразино[2,1-*b*]хиназолин-6-она (**26**). Блокирование образования аутоиндукторов *E. coli* и *S. sonnei* также составляет основу антимикробного действия этого вещества [112].

26

Исследована способность фторхиназолинонов (**27**), содержащих бензилиденаминовый фрагмент, и фторзамещенных производных с L-аминокислотным заместителем нарушать процесс образования биопленок *S. aureus* и *M. luteus* [113]. Доказана ярко выраженная активность веществ, в структуру которых в качестве заместителя R входят 3-(4-фторбензилиденамино)-, 3-(4-метоксибензилиденамино)-, 3-(4-метилбензилиденамино)-, 3-(3-фенилаллилиденамино)- или 3-гидразидные фрагменты, а также L-глутамин или L-цистеин, в отношении грамположительных (*S. aureus*, *B. subtilis*, *M. luteus*) и грамотрицательных бактерий (*E. coli*, *P. aeruginosa*) [113].

При помощи метода молекулярного докинга установлен механизм взаимодействия фторзамещенных хиназолинона с биотинкарбоксилазой. Показано образование водородной связи между атомом N1 ядра хиназолинона и гидроксильной группой лизина (LysA159) биотинкарбоксилазы. Отмечается, что атом кислорода хиназолинонового цикла производного, содержащего 3-(4-метоксибензилиденамино)-заместитель, способен образовывать водородную связь с остатком лизина (LysA159) карбоксилазы. Наличие в молекуле в качестве R метокси-группы обуславливает дополнительное взаимодействие между атомом кислорода и остатком 2,6-диаминогексановой кислоты. Замещение хиназолинонового ядра амино-группой опосредует дополнительное связывание с глутамином (GluA288) белковой молекулы. Образованные промежуточные комплексы стабилизированы во всех случаях связями между ароматическим кольцом ядра хиназолинона и остатками гистидина (HisA209 и HisA236). Доказано, что способность 3-(4-метоксибензилиденамино)- и 3-(4-метилбензилиденамино)-производных хиназолинона оказывать воздействие на образование биопленок *S. aureus* (IC_{50} 1.0 ± 0.15 мкг мл⁻¹) и *M. luteus* (IC_{50} 1.6 ± 0.11 мкг мл⁻¹) выражена в наибольшей степени [113].

IV.5. Производные хиназолинона, проявляющие противомикробное действие за счет подавления воспалительной реакции

Понимание значимости пиримидинового фрагмента при протекании многих биологических процессов позволило использовать его для создания конденсированных систем с хиназолиноном. Показано проявление выраженной про-

тивомикробной активности соединениями, содержащими пиримидиновый цикл, замещенный бензильным или фторфенильным радикалом, связанным с гетероциклом кетонной группой в отношении *S. aureus*. Замещение R² в соединении **29** остатком циклопропана или урацила способствует приобретению веществом способности оказывать фармакологическое действие на *E. faecalis*. Введение этоксифенильного или циклопропанового фрагмента R¹ в соединении **28** делает производное активным в отношении *E. coli* и *Klebsiella*. Продемонстрирована наиболее выраженная способность подавлять жизнедеятельность *S. aureus* и *E. coli* производными **29**, замещенными фурановым циклом и R = 3-PhF, с МИК < 0.4 и 0.8 г мл⁻¹ соответственно; *E. faecalis* – соединением **29**, содержащим R = урацил-5-ил при МИК < 0.2 г мл⁻¹ [114].

R¹ = SO₂Me, SO₂CHMe₂,
SO₂Ph, SO₂(2,4-PhF₂), SO₂(2-PhCl), SO₂(4-PhPr)

R² = циклопропил, 3-PhF, 2,3,4,5-PhF₄,
фуран-3-ил, 2,3,4-триазол-1-ил, урацил-5-ил

Установлено, что проявление антимикробного действия производными спиро[3.3]пиперидинхинолинона (**28**, **29**) обусловлено их воздействием на ферментативную мишень – циклооксигеназу (ЦОГ-2). Оправдано рассмотрение таких соединений в качестве “хелперных веществ” или “модуляторов макрофагов” [115]. Показана высокая аффинность взаимодействия веществ (**28**, **29**) за счет трифторметильной группы с белковой молекулой [114].

Проявление противомикробного эффекта за счет подавления ЦОГ-2 продемонстрировано для 3-(бензотиазол-2-ил)-производных 2-фенил-4(3H)-хинолинона (**30**, **31**), представляющих конденсированные системы, содержащие ядра бензотиазола и хинолинона [116]. Показана способность производных **30** подавлять жизнеде-

тельность *E. coli* (МИК 23.5–42 мкг мл⁻¹), *P. aeruginosa* (МИК 21–46.5 мкг мл⁻¹), *S. aureus* (МИК 28–47 мкг мл⁻¹) и *E. faecalis* (МИК 28–48 мкг мл⁻¹). Продемонстрирована более выраженная антимикробная активность ряда **31** в отношении перечисленных патогенов: *E. coli* (МИК 8.5–17.5 мкг мл⁻¹), *P. aeruginosa* (МИК 8–15.5 м), *S. aureus* (МИК 1.5–13 мкг мл⁻¹) и *E. faecalis* (МИК 1–12.8 мкг мл⁻¹) [116].

30

31

R¹–R³ = Cl, Br, NO₂, OMe, OEt

IV.6. Производные хиназолинона, оказывающие воздействие на ферментативные системы, принимающие участие во внутриклеточном метаболизме биологически активных веществ

Имеющиеся сведения об антимикробном потенциале как триазиновых производных, так и соединений, содержащих хиназолиноновый фрагмент, легли в основу стратегии получения веществ, содержащих оба гетероцикла, и проявляющих активность как в отношении грамотрицательных бактерий (*S. enterica*, *P. aeruginosa*, *E. coli*), так и грамположительных микроорганизмов (*B. subtilis*, *S. aureus*, *L. monocitogenes*) [117].

Уникальность структуры триазинового цикла, обуславливающая высокую степень его взаимодействия с мишенью посредством водородных связей, образуемых тремя атомами азота, склонность к диполь-дипольным и π–π стэкинг-взаимодействиям, стабильность в окислительно-восстановительных и гидролитических процессах в кислой и щелочной средах обеспечивают простоту синтетического процесса получения комбинированных систем с хиназолиноновым производным, характеризующихся высокой степенью антибактериального эффекта, вследствие высокой полярности и легкости связывания с белковыми молекулами ферментов-мишеней [118].

Описано воздействие комбинированного хиназолинонового производного триазина (**32**, **33**)

на редуктазу (DHFR) *S. aureus*. Результаты молекулярного докинга, свидетельствующие об образовании дополнительной водородной связи между сульфонамидной группой вещества и аминокислотными остатками серина, изолейцина, фенилаланина и глутамина активного сайта фермента, объясняют более выраженный антимикробный эффект триазолилхиназолинона в отношении *S. aureus* и MRSA, по сравнению с индивидуальными соединениями триазола – цефатризина и тазобактама [118]. Выявленная антибактериальная активность производных (**26**) в отношении *S. enterica*, *P. aeruginosa*, *E. coli* и *S. aureus* может быть подтверждена значениями МИК диапазона 16–32 мг мл⁻¹ и веществ ряда (**27**) – *S. aureus* (МИК 0.5 мг мл⁻¹). Охарактеризовано противомикробное действие (**26**, **27**) на MRSA по значениям IC₅₀ (0.5–2 мг мл⁻¹) [118].

32

33

R = Bn, 3-BnCl

Описано ингибирование пантотенатсинтетазы *M. tuberculosis* производными 6-метокси-7-(1-фенил-1,2,3-триазол-4-ил)метилокси-производных хиназолин-4(3H)-она (**34**) (МИК 7–11 мкг мл⁻¹) [118].

34

R¹ = 4-PhF, 4-PhCl, 4-PhCF₃, 3,4-Ph(OMe)₂

R² = 4-PhMe, 4-PhCl, 1,3-бензодиоксол-2-ил

Показано, что соединение, содержащее в качестве R¹ фенильный цикл, содержащий две метокси-группы, и бензодиоксолановый цикл в составе R², проявляет выраженную противотуберкулезную активность (МИК 7 мг мл⁻¹). Результаты молекулярного докинга формируют представление об образовании промежуточного комплекса за счет взаимодействия кислорода карбонильной группы хиназолинонового ядра с остатками глицина (Gly92), серина (Ser196) и аргинина (Arg200) пантотенатсинтазы. Обосновано проявление производными 6-метокси-7-(1-фенил-1,2,3-триазол-4-ил)метилоксихиназолин-4(3H)-она антибактериальной активности в отношении *E. coli*, *P. aeruginosa*, *B. subtilis* и *S. aureus* [118]. Установлено уменьшение степени антимикробного эффекта в ряду соединений, содержащих в триазольном ядре следующие заместители: 6-гидрокси-4-метил-2H-хромен-2-он > 4-метилфенил > бензо[d][1,3]диоксол и 4-хлор-, 4-фторфенил. Повышение гидрофильности вещества при введении 4-хлорфенильного, 4-трифторметилфенильного или 7-гидрокси-4-метилхроменового фрагментов в триазольный цикл производных хиназолинона, вероятно, обуславливает выраженное антибактериальное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии [117, 118].

Охарактеризована антибактериальная активность соединений, полученных замещением хиназолин-4(3H)-она в положении 3 фрагментами азолилэтанола, такими как имидазолил, триазолил, тетразолил, бензоимидазолил и бензотриазолил (35, 36), в отношении *M. luteus*, *MRSA*, *S. aureus*, *Bacillus subtilis*, *E. coli*, *B. proteus* и *E. typhosa* (МИК 16–32 мкг мл⁻¹). Вероятно, присутствие в гетероциклических заместителях большого количества атомов азота – доноров электронов – при образовании водородной связи увеличивает аффинность связывания производных с активным сайтом редуктазы [117].

35

36

Использование имидазола, как важной составляющей пурина, гистамина, гистидина и нуклеиновых кислот для конденсации с веществами, молекула которых содержит хиназолиноновое

ядро, также способствовало образованию продуктов реакции, проявляющих более выраженный антибактериальный эффект. Вероятно, преобразование структуры имидазола в ходе биохимического процесса приводит к образованию соли имидазолия, которая характеризуется большей растворимостью в воде и, как следствие, биодоступностью и всасываемостью [26, 27]. Охарактеризована способность соединений, содержащих в структуре имидазольный гетероцикл, активировать фермент ароматазу, который, в свою очередь, принимает участие в синтезе производных метилтестостерона. Установлено, что накопление последних в мембране клетки приводит к деструктурированию ацильных цепей фосфолипидов, вследствие чего нарушается целостность клеточной оболочки [119].

Доказана способность комбинированных гетероциклических веществ, структура которых включает бензофурановый, имидазольный циклы и ядро хиназолинона, оказывать антимикробное действие на *S. aureus*, *B. subtilis*, *L. monocitogenes*, *E. coli*, *P. aeruginosa* и *S. enteritidis* (МИК 128–512 мкг мл⁻¹) [26, 27].

37 R¹, R² = H, Cl, OMe

Установлено, что соединения, содержащие галогены в хиназолиноновом и бензофурановом циклах (37), проявляют ярко выраженный противомикробный эффект, по сравнению с другими производными. Вероятно, наличие галогенов в молекуле способствует повышению гидрофобности веществ. Замещение указанных функциональных фрагментов метокси-группой в положениях C5 и C6 приводит к снижению антимикробной активности, что является следствием уменьшения липофильности соединений. Описана ориентация хиназолинонового ядра на гем фермента ароматазы с дальнейшим образованием гидрофобного взаимодействия с гем-порфиринами [26]. Методами молекулярного докинга описано связывание имидазольных и бензофурановых циклов силами Ван-дер-Ваальса с аминокислотными остатками лейцина (Leu372), фенилаланина (Phe134), изолейцина (Ile133), триптофана (Trp224) и валина (Val370) активного сайта ароматазы. Показано участие метокси-замещенного ядра хиназолинона в образовании водородной связи с остатком метионина (Met374). Введение метокси-группы в бензофурановый цикл дает возможность образования дополнительных водо-

родных связей с остатком серина (Ser 478) активного сайта ароматазы [26, 27].

Необходимость поиска эффективных, обладающих избирательностью противотуберкулезных препаратов в отношении бактерий, у которых сформировалась устойчивость к используемым в медицине лекарственным веществам, способствовала открытию производных на основе хиназолинона [93].

Способность хиназолинонового фрагмента ингибировать такие важные ферменты *M. tuberculosis*, принимающие участие в росте и поддержании жизнедеятельности микроорганизма, как: пуриноклеозидфосфорилаза, еноил-[ацил-белок-носитель] редуктаза (InhA), пуриноклеозидфосфорилаза (PNP), шикиматкиназа, гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансфераза (HGPRT) – создала предпосылки для получения его соединений, структура которых содержит фуллереновый каркас. Известно, что липофильность последнего обеспечивает легкое проникновение веществ через клеточную мембрану, вследствие чего происходит высвобождение хиназолинона, который вызывает гибель клеток, ингибируя их метаболизм [93].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что уникальность химической природы веществ, содержащих в структуре ядро хиназолинона, обуславливает разные варианты механизмов антимикробного действия, направленного как на вирулентный признак патогена, так и на систему, функционирование которой обеспечивает его реализацию. Являясь гетероциклическими системами, насыщенными электронодонорными центрами в виде атомов азота и кислорода карбонильной группы, хиназолиноновые производные способны к образованию промежуточных комплексных соединений, стабилизированных системой водородных связей, а также ван-дер-ваальсовыми и стэкинг-взаимодействиями, которые обеспечивают высокую аффинность. Участие в межмолекулярном связывании благоприятно сказывается на проявлении антимикробного действия посредством влияния на ферментативные мишени, а также рецепторно-регуляторные белки и системы сигнализации клеток патогена. Введение неполярных заместителей в молекулу веществ с хиназолиноновым ядром способствует повышению гидрофобности веществ, а следовательно, способствует возникновению возможности работы противомикробного агента по механизму, направленному на нарушение целостности липофильного слоя мембраны клетки. Создание комбинированных систем на основе хиназолинона за счет его связывания с тиольным, индольным, бензофурановым и дру-

гими гетероциклами, характеризующимися выраженной антимикробной активностью, способствует поиску производных, проявляющих фармакологический эффект в отношении различных патогенных штаммов.

Таким образом, получение веществ хиназолинонового ряда, отличающихся оптимальными фармакологическими показателями, а также прогнозирование механизма их противомикробного действия, разработка соединений, лиганды которых имеют мультитаргетную направленность, представляет основу комплексной работы соавторов обзорной статьи и предполагает использование ее материалов для реализации поставленных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Desai N.C., Dodiya A., Shihory N. // J. Saudi Chem. Soc. 2013. V. 17. P. 259–267. <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2011.04.001>
2. Шемякин И.Г., Фирстова В.В., Фурсова Н.К., Абаев И.В., Филиппович С.Ю., Игнатов С.Г., Дятлов И.А. // Биохимия. 2020. Т. 85. № 11. С. 1615–1632. <https://doi.org/10.31857/S0320972520110081>
3. Borges A., Saavedra M.J., Simoes M. // Curr. Med. Chem. 2015. V. 22. P. 2590–2614. <https://doi.org/10.2174/0929867322666150530210522>
4. Гординская Н.А., Борискина Е.В., Кряжев Д.В. // Здоровье населения и среда обитания. 2021. № 4. С. 50–56. <https://doi.org/10.35627/2219-5238/2021-337-4-50-56>
5. Карева Е.Н., Сереброва С.Ю., Лазарева Н.Б., Шипилова С.Ю., Булгакова В.А., Козаева Л.П., Кононова И.Н., Яровой С.К., Дроздов В.Н., Стародубцев А.К. // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2018. Т. 81. № 9. С. 26–32. <https://doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-9-26-32>
6. Путилина А.Д., Коменкова Т.С., Зайцева Е.А. // Медико-фармацевтический журнал “Пульс”. 2019. Т. 21. № 10. С. 125–130. <https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2019-21-10-125-130>
7. Du D., Wang-Kan X., Neuberger A., Veen H.W., Pos K.M., Piddock L.J.V., Luisi B.F. // Nat. Rev. Microbiol. 2018. V. 16. № 9. P. 523–539. <https://doi.org/10.1038/s41579-018-0048-6>
8. Иванов М.Э., Фурсова Н.К., Потапов В.Д. // Клиническая лабораторная диагностика. 2022. Т. 67. № 1. С. 53–58. <https://doi.org/10.51620/0869-2084-2022-67-1-53-58>
9. Карпова Е.В., Топальский Д.В. // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. 2022. Т. 11. № 2. С. 214–223. <https://doi.org/10.34883/PI.2022.11.2.018>
10. Pagès J.M., Amaral L., Fanning S. // Curr. Med. Chem. 2011. V. 18. P. 2969–2680. <https://doi.org/10.2174/092986711796150469>
11. Henderson P.J., Maher C., Elbourne L.D.H., Eijkelkamp B.A., Paulsen I.T., Hassan K.A. // Chem. Rev.

2021. V. 121. № 9. P. 5417–5478.
<https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c01226>
12. *Alav I., Sutton J.M., Rahman K.M.* // J. Antimicrob. Chemother. 2018. V. 73. № 8. P. 2003–2020.
<https://doi.org/10.1093/jac/dky042>
 13. *Hassan K.M., Datta D., Nguyen A.N.* // Antibiotics. 2021. V. 11. № 1. P. 40.
<https://doi.org/10.3390/antibiotics11010040>
 14. *Liu J., Takiff H.E., Nikaido H.* // J. Bacteriol. 1996. V. 178. № 13. P. 3791–3795.
<https://doi.org/10.1128/jb.178.13.3791-3795.1996>
 15. *Kumar S., Lekshmi M., Parvathi A., Ojha M., Wenzel N., Varela M.F.* // Microorganisms. 2020. V. 8. № 2. P. 266–286.
<https://doi.org/10.3390/microorganisms8020266>
 16. *Takiff H.E., Cimino M., Musso M.C., Weisbrodi T., Martinez R., Delgado M.B., Salazar L., Bloom B.R., Jacobs W.R.* // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1996. № 93. P. 362–367.
<https://doi.org/10.1073/pnas.93.1.362>
 17. *Costa S.S., Sobkowiak B., Parreira R., Edgeworth J.D., Viveiros M., Clark T.G., Couto I.* // Front. Genet. 2019. № 9. P. 710.
<https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00710>
 18. *Туницкая В.Л., Хомутов А.Р., Кочетков С.Н., Котовская С.К., Чарушин В.Н.* // Acta Naturae. 2011. Т. 3. № 4. С. 98–104.
 19. *Aguirre A.L., Chheda P.R., Lentz S.R.C., Held H.A., Groves N.P., Hiasa H., Kerns R.J.* // Bioorg. Med. Chem. 2020. V. 28. № 10. P. 115439.
<https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115439>
 20. *Федорчук В.В., Грудина С.А., Кротова Л.А., Черкашин Е.А., Сидоренко С.В., Тишков В.И.* // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2002. Т. 43. № 6. С. 349–352.
 21. *Barančoková M., Kikelj D., Paš J.* // Future Med. Chem. 2018. V. 10. № 10. P. 1207–1227.
<https://doi.org/10.4155/fmc-2017-0257>
 22. *Kolarič A., Germe T., Hrast M., Stevenson C.E., Lawson D.M., Burton N.P., Vörös J., Maxwell A., Minovski N., Anderluh M.* // Nat. Commun. 2021. V. 12. № 1. P. 150–163.
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20405-8>
 23. *Khan T., Sankhe K., Suvarna V., Sherje A., Patel K., Dravyakar B.* // Biomed. Pharmacotherapy. 2018. V. 103. P. 923–938.
<https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.04.021>
 24. *Champoux J.J.* // Annu. Rev. Biochem. 2001. V. 70. P. 369–413.
<https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.70.1.369>
 25. *Dighe S.N., Collet T.A.* // Eur. J. Med. Chem. 2020. V. 199. P. 112326.
<https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112326>
 26. *Asadi P., Khodarahmi G., Jahanian-Najafabadi A., Saghale L., Hassanzadeh F.* // Iran. J. Basic. Med. Sci. 2017. V. 20. № 9. P. 975–989.
<https://doi.org/10.22038/IJBMS.2017.9260>
 27. *Асямов К.В., Свёклина Т.С., Торюпов М.С., Мисяков Е.П., Фролов Д.С.* // Лечение и профилактика. 2020. Т. 10. № 4. С. 106–118.
 28. *Fortune J.M., Osheroff N.* // J. Biol. Chem. 1998. V. 273. № 28. P. 17643–17650.
<https://doi.org/10.1074/jbc.273.28.17643>
 29. *Сутормин Д.А., Галивондзян А.Х., Полховский А.В., Камалян С.О., Северинов К.В., Дубилей С.А.* // Acta Naturae. 2021. Т. 13. № 1. С. 59–75.
<https://doi.org/10.32607/actanaturae.11058>
 30. *Pascale G.D., Nazi I., Harrison P.H., Wright G.D.* // J. Antibiot. 2011. V. 64. № 7. P. 483–487.
<https://doi.org/10.1038/ja.2011.37>
 31. *Nazi I., Scott A., Sham A., Rossi L., Williamson P.R., Kronstad J.W., Wright G.D.* // Antimicrob. Agents Chemother. 2007. V. 51. № 5. P. 1731–1736.
<https://doi.org/10.1128/AAC.01400-06>
 32. *Chaton C.T., Rodriguez E.S., Reed R.W., Li J., Kerner C.W., Korotkov K.V.* // Sci. Rep. 2019. V. 9. № 1. P. 1–11.
<https://doi.org/10.1038/s41598-019-56722-2>
 33. *Mabkhot Y.N., Al-Har M.S., Barakat A., Aldawsari F.D., Aldalbahi A., Ul-Haq Z.* // Molecules. 2014. V. 19. № 7. P. 8725–8739.
<https://doi.org/10.3390/molecules19078725>
 34. *Matrelov N., Kurbatskaya V., Rudevitsa Z., Leonchik A., Fridmanis D.* // Antibiotics. 2021. V. 10. № 2. P. 164.
<https://doi.org/10.3390/antibiotics10020164>
 35. *Spirig T., Weiner E.M., Clubb R.T.* // Mol. Microbiol. 2011. V. 82. № 5. P. 1044–1059.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2011.07887.x>
 36. *Зигангирова Н.А., Лубенец Н.Л., Зайцев А.В., Пушкарь Д.Ю.* // Клиническая микробиология и анти-микробная химиотерапия. 2021. Т. 23. № 2. С. 184–194.
<https://doi.org/10.36488/cmasc.2021.2.184-194>
 37. *Volynets G., Vyshniakova H., Nitulescu G., Nitulescu G.M., Ungurianu A., Margina D., Moshynets O., Bdzhola V., Koleiev I., Iungin O., Tarnavskiy S., Yarmoluk S.* // Molecules. 2021. V. 26. № 23. P. 7095–7106.
<https://doi.org/10.3390/molecules26237095>
 38. *Wang J., Shi Y., Jing S., Dong H., Wang D., Wang T.* // Molecules. 2019. V. 24. № 3. P. 465–475.
<https://doi.org/10.3390/molecules24030465>
 39. *Sapra R., Rajora A.K., Kumar P., Maurya G.P., Pant N., Haridas V.* // J. Med. Chem. 2021. V. 64. № 18. P. 13097–13130.
<https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00386>
 40. *Jaudzems K., Kurbatska V., Jēkabsons A., Bobrovs R., Rudevica Z., Leonchiks A.* // ACS Infect. Dis. 2019. V. 6. № 2. P. 186.
 41. *Bradshaw W.J., Davies A.H., Chambers C.J., Roberts A.K., Shone C.C., Acharya K.R.* // FEBS J. 2015. V. 282. P. 2097–2114.
<https://doi.org/10.1111/febs.13288>
 42. *Susmitha A., Bajaj H., Nampootheri K.M.* // The Cell Surface. 2021. V. 7. P. 100055.
<https://doi.org/10.1016/j.tesw.2021.100055>
 43. *Narashimamurthy N., Rao A.R., Sastry G.N.* // Curr. Med. Chem. – Anti-Cancer Agents. 2004. V. 4. № 6. P. 523–534.
<https://doi.org/10.2174/1568011043352669>
 44. *Alfonso A.Y.C., Lagares L.M., Novic M., Benfenati E., Kumar A., Chayawan* // Toxicology in Vitro. 2022. V. 81.

- P. 105332.
<https://doi.org/10.1016/j.tiv.2022.105332>
45. *Pingaew R., Prachayasittikul V., Anuwongcharoen N., Prachayasittikul S., Ruchirawat S., Prachayasittikul V.* // *Bioorg. Chem.* 2018. V. 79. P. 171–178.
<https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2018.05.002>
 46. *Sauvage E., Kerff F., Terrak M., Ayala J.A., Charlier P.* // *FEMS Microbiol. Rev.* 2008. V. 32. № 2. P. 234–258.
<https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2008.00105.x>
 47. *Meroueh S.O., Bencze K.Z., Heseck D., Lee M., Fisher J.F., Stemmler T.L., Mobashery S.* // *PNAS.* 2006. V. 13. № 12. P. 4404–4409.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0510182103>
 48. *Egan A.J.F., Cleverley R.M., Peters K., Lewis R.J., Vollmer W.* // *FEBS J.* 2017. V. 284. № 6. P. 851–867.
<https://doi.org/10.1111/febs.13959>
 49. *Филиппова А.А., Рубцова М.Ю., Уляшова М.М., Фурсова Н.К.* // *Бактериология.* 2020. Т. 5. № 3. С. 34–46.
<https://doi.org/10.20953/2500-1027-2020-3-34-46>
 50. *Ferrer-González E., Huh H., Al-Tameemi H.M., Boyd J.M., Lee S-H., Pilch D.S.* // *J. Bacteriol.* 2021. V. 203. № 16. P. e00204-21.
<https://doi.org/10.1128/JB.00204-21>
 51. *Łeski T.A., Tomasz A.* // *J. Bacteriol.* 2005. V. 187. № 5. P. 1815–1824.
<https://doi.org/10.1128/JB.187.5.1815-1824.2005>
 52. *Teo A.C.K., Roper D.I.* // *Antibiotics.* 2015. V. 4. № 4. P. 495–520.
<https://doi.org/10.3390/antibiotics4040495>
 53. *Kuru E., Radkov A., Meng X., Egan A., Alvarez L., Dowson A., Booher G., Breukink E., Roper D.I., Cava F., Vollmer W., Brun Y., VanNieuwenhze M.S.* // *ACS Chem. Biol.* 2019. V. 4. № 12. P. 2745–2756.
<https://doi.org/10.1021/acscchembio.9b00664>
 54. *Martinez de Tejada G., Sanchez-Gómez S., Razquin-Olazarán I., Kowalski I., Kaconis Y., Heinbockel L., Andrá J., Schürholz T., Hornef M., Dupont A., Garidel P., Guismann T., David S.A., Brandenburg K.* // *Curr. Drug Targets.* 2012. V. 13. № 9. P. 1121–1151.
<https://doi.org/10.2174/138945012802002410>
 55. *Brauweiler A.M., Goleva E., Leung D.Y.* // *J. Invest. Dermatol.* 2019. V. 139. № 8. P. 1753–1761.
<https://doi.org/10.1016/j.jid.2019.02.006>
 56. *Ahn K.B., Baik J.E., Yun C.H., Han S.H.* // *Front. Microbiol.* 2018. V. 9. P. 327.
<https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00327>
 57. *Richter S.G., Elli D., Kim H.K., Hendrickx A.P.A., Sorg J.A., Schneewind O., Missiakas D.* // *PNAS.* 2013. V. 110. № 9. P. 3531–3536.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1217337110>
 58. *Zhang B., Liu X., Lambert E., Mas G., Hiller S., Veening J.W., Perez C.* // *Nat. Struct. Mol. Biol.* 2020. V. 27. № 6. P. 561–569.
<https://doi.org/10.1038/s41594-020-0425-5>
 59. *Wilson R., Kumar P., Parashar V., Vilchêze C., Churlet R.V., Freundlich J.S., Barnes S.W., Walker J.R., Szymonifka M.J., Marchiano E., Shenai S., Colangeli R., Jacobs W.R., Jr., Neidlich M.B., Kremer L., Alland D.* // *Nat. Chem. Biol.* 2013. V. 9. № 8. P. 499–506.
<https://doi.org/10.1038/nchembio.1277>
 60. *Frankfather K., Jiang X., Xu F.F.* // *J. Am. Soc. Mass spectrum.* 2018. V. 29. P. 1688–1699.
<https://doi.org/10.1007/s13361-018-1993-z>
 61. *Bon C., Cabantous S., Julien S., Guillet V., Chalut C., Rima J., Brison Y., Malaga W., Sanchez-Dafun A., Galvalda S., Quémard A., Marcoux J., Waldo G.S., Guilhot C., Mourey L.* // *BMC Biol.* 2022. V. 20. № 1. P. 147.
<https://doi.org/10.1186/s12915-022-01337-9>
 62. *Bhatt A., Molle V., Besra G.S., Jacobs W.R., Jr., Kreime L.* // *Mol. Microbiol.* 2007. V. 64. № 6. P. 1442–1454.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2007.05761.x>
 63. *Von Delft F., Lewendon A., Dhanaraj V., Blundell T.L., Abell C., Smith A.G.* // *Structure.* 2001. V. 9. № 5. P. 439–450.
[https://doi.org/10.1016/S0969-2126\(01\)00604-9](https://doi.org/10.1016/S0969-2126(01)00604-9)
 64. *Hamilton T.D., Papaefstathiou G.S., MacGillivray L.R.* // *Etter Transactions.* 2005. V. 1. P. 2–5.
 65. *Waldrop G.L., Rayment I., Holden H.M.* // *Biochemistry.* 1994. V. 33. № 34. P. 10249–10256.
<https://doi.org/10.1021/bi00200a004>
 66. *Walley J.W., Kliebenstein D.J., Bostock R.M., Dehesh K.* // *Curr. Opin. Plant Biol.* 2013. V. 16. № 4. P. 520–526.
<https://doi.org/10.1016/j.pbi.2013.06.011>
 67. *Hirakawa H., Kurushima J., Hashimoto Y., Tomita H.* // *Antibiotics.* 2020. V. 9. № 10. P. 635.
<https://doi.org/10.3390/antibiotics9100635>
 68. *Thomas L., Cook L.* // *Infect. Immun.* 2020. V. 88. № 7. P. e00931-19.
<https://doi.org/10.1128/IAI.00931-19>
 69. *Tiwari S., Jamal S.B., Hassan S.S., Carvalho P.V.S.D., Almeida S., Barh D., Ghosh P., Silva A., Castro T.L.P., Azevedo V.* // *Front. Microbiol.* 2017. V. 8. P. 1878.
<https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01878>
 70. *Bhagirath A.Y., Li Y., Patidar R., Yerex K., Ma X., Kumar A., Duan K.* // *Int. J. Mol. Sci.* 2019. V. 20. № 7. P. 1781.
<https://doi.org/10.3390/ijms20071781>
 71. *Gotoh Y., Doi A., Furuta E., Dubrac S., Ishizaki Y., Okada M., Igarashi M., Misawa N., Yoshikawa H., Okajima T., Msadek R., Utsumi T.* // *J. Antibiot.* 2010. V. 63. P. 127–134.
<https://doi.org/10.1038/ja.2010.4>
 72. *Kato A., Ueda S., Oshima T., Inukai Y., Okajima T., Igarashi M., Eguchi Y., Ryutarō Utsumi.* // *J. Gen. Appl. Microbiol.* 2017. V. 63. № 4. P. 212–221.
 73. *Хайтович А.Б., Мурейко Е.А.* // *Таврический медицинко-биологический вестник.* 2018. Т. 21. № 1. С. 214–220.
 74. *Otto M.* // *FEMS Microbiol. Lett.* 2004. V. 241. № 2. P. 135–141.
<https://doi.org/10.1016/j.femsle.2004.11.016>
 75. *Шпаков А.О.* // *Микробиология.* 2009. Т. 78. № 2. С. 163–175.
<https://doi.org/10.1134/S0026261709020015>
 76. *Баженов С.В., Шеглова Е.С., Фомин В.В., Завильгельский Г.Б., Манухов И.В.* // *Генетика.* 2022. Т. 58. № 2. С. 148–156.
<https://doi.org/10.31857/S0016675822020023>
 77. *Марданова А.М., Кабанов Д.А., Рудакова Н.Л., Шарипова М.Р.* *Биопленки: Основные принципы ор-*

- ганизации и методы исследования. Учебное пособие. Казань, 2016. С. 9.
78. *Chu W., McLean R.J.C.* // *J. Aquat. Anim. Health.* 2016. V. 28. № 2. P. 91–96.
<https://doi.org/10.1080/08997659.2016.1150907>
 79. *Курсов С.В., Никонов В.В.* // Медицина неотложных состояний. 2016. Т. 5. № 76. С. 27–35.
<https://doi.org/10.22141/2224-0586.5.76.2016.76430>
 80. *Alsibaee A.M., Al-Yousef H.M., Al-Salem H.S.* // *Molecules.* 2023. V. 28. № 3. P. 978.
<https://doi.org/10.3390/molecules28030978>
 81. *Dogovski C., Atkinson S.C., Dommaraju S., Dobson R., Perugini M., Hor L., Hutton C., Gerrard A.* // *Encyclopedia of Life Support Systems.* 2009. V. 11. P. 116–136.
 82. *Jafari E., Khajouei M.R., Hassanzadeh F., Hakimelahi G.H., Khodarahmi G.A.* // *Res. Pharm. Sci.* 2016. V. 11. № 1. P. 1.
 83. *Цибизова А.А., Ясенявская А.Л., Озеров А.А., Тюренков И.Н., Башкина О.А., Самотруева М.А.* // Сибирский научный медицинский журнал. 2021. Т. 41. № 6. С. 56–60.
<https://doi.org/10.18699/SSMJ20210606>
 84. *Цибизова А.А., Самотруева М.А., Ковалев В.Б., Тюренков И.Н.* // Астраханский медицинский журнал. 2017. Т. 12. № 4. С. 27–43.
 85. *Samotrueva M.A., Ozerov A.A., Starikova A.A., Gabitova N.M., Merezhkina D.V., Tsibizova A.A., Tyurenkov I.N.* // *Pharm. Pharmacol.* 2021. V. 9. № 4. P. 318–329.
<https://doi.org/10.19163/2307-9266-2021-9-4-318-329>
 86. *Старикова А.А., Габитова Н.М., Цибизова А.А., Озеров А.А., Тюренков И.Н., Башкина О.А., Самотруева М.А.* // Астраханский медицинский журнал. 2022. Т. 17. № 1. С. 60–71.
<https://doi.org/10.48612/agmu/2022.17.1.60.71>
 87. *Жарких Л.И., Смирнова Ю.А.* // Вестник технологического университета. 2020. Т. 23. № 1. С. 104–111.
 88. *Sen T., Neog K., Sarma S., Manna P., Boruah H.P.D., Gogoi P., Singh A.K.* // *Bioorg. Med. Chem.* 2018. V. 26. № 17. P. 4942–4951.
<https://doi.org/10.1016/j.bmc.2018.08.034>
 89. *Rajasekar K.K., Nizamuddin N.D., Surur A.S., Mekonnen Y.T.* // *Research and reports on Medical Chemistry.* 2016. V. 6. P. 15–26.
<https://doi.org/10.2147/RRMC.S91474>
 90. *Khodarakhmi G.A., Hajway M.R., Hakimelahi G.H., Abedi D., Jafari E., Hassanzadeh F.* // *Res. Pharm. Sci.* 2012. V. 7. № 3. P. 151.
 91. *Qian Y., Allegretta G., Janardhanan J., Peng Z., Mahasenan K.V., Lastochkin E., Gozun M.M.N., Tejera S., Schroeder V.A., Wolter W.R., Feltzer R., Mobashery S., Chang M.* // *J. Med. Chem.* 2020. V. 63. № 10. P. 5287–5296.
<https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.0c00153>
 92. *Ibrahim M.A.A., Abdeljawaad K.A.A., Abdelrahman A.H.M., Alzahrani O.R., Alshabrm F.M., Khalaf E., Mustafa M.F., Alrumaihi F., Allemailem K.S., Soliman M.E.S., Paré P.W., Hegazy M.E.F., Atia M.A.M.* // *Antibiotics.* 2021. V. 10. № 8. P. 934.
 93. *Norouzbahari M., Salarinejad S., Güran M., Şanlıtürk G., Emamgholipour Z., Bijanzadeh H.R., Toolabi M., Foroumadi A.* // *DARU J. Pharm. Sci.* 2020. V. 28. № 2. P. 661–672.
<https://doi.org/10.1007/s40199-020-00373-6>
 94. *Patel M.B., Kumar S.P., Valand N.N., Jasrai Y.T., Menon S.K.* // *Mol. Model.* 2013. V. 19. № 8. P. 3201–3217.
<https://doi.org/10.1007/s00894-013-1820-1>
 95. *Espeland L.O., Georgiou C., Klein R., Bhukya H., Haug B.E., Underhaug J., Mainkar P.S., Brenk R.* // *ChemMedChem.* 2021. V. 16. P. 2715–2726.
<https://doi.org/10.1002/cmdc.202100302>
 96. *Devi P.U., Lakshmi K.A., Ramji M.T., Khan P.A.A.* // *J. Pharm. Res.* 2010. V. 3. № 11. P. 2765–2768.
 97. *Sharma P.C., Jane A., Jane S., Pahwa R., Yar M.S.* // *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* 2010. V. 25. № 4. P. 577–589.
<https://doi.org/10.3109/14756360903373350>
 98. *Fedorowicz J., Saczewski J.* // *Monatsh. Chem.* 2018. V. 149. № 7. P. 1199–1245.
<https://doi.org/10.1007/s00706-018-2212-0>
 99. *Jawad A.M., Aljamali N.M., Jwad S.M.* // *Indian J. Forensic Med. Toxicol.* 2020. V. 14. № 2. P. 1115–1122.
<https://doi.org/10.37506/ijfnt.v14i2.3067>
 100. *Aguirre A.L., Cheda R., Lenz S.R., Held H.A., Groves N., Hiasa H., Kerns R.J.* // *Bioorg. Med. Chem.* 2020. V. 28. № 10. P. 115439.
<https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115439>
 101. *Mahato A.K., Srivastava B., Shanthi C.N.* // *Inventi Rapid: Med. Chem.* 2011. V. 1. P. 1–6.
 102. *Mahato A., Shrivastava B., Shanthi N.* // *Chem. Sci. Trans.* 2015. V. 4. № 2. P. 595–603.
<https://doi.org/10.7598/cst2015.995>
 103. *Khodarahmi G., Asadi P., Hassanzadeh F., Khodarahmi E.* // *J. Res. Med. Sci.* 2015. V. 20. № 11. P. 1094–1104.
<https://doi.org/10.4103/1735-1995.172835>
 104. *Arévalo J.M.C., Amorim J.C.* // *Sci. Rep.* 2022. V. 12. № 1. P. 4742.
<https://doi.org/10.1038/s41598-022-08359-x>
 105. *Ghorab M.M., Alqahtani A.S., Soliman A.M., Askar A.A.* // *Int. J. Nanomedicine.* 2020. V. 15. P. 3161.
<http://doi.org/10.2147/IJN.S241433>
 106. *Carabajal M.A., Asquith C.R.M., Laitinen T., Tizzard G.J., Yim L., Rial A., Chabalgoity J.A., Zuercher W.J., Vescovi E.G.* // *Antimicrob. Agents Chemother.* 2019. V. 64. № 1. P. e01744–19.
<https://doi.org/10.1128/AAC.01744-19>
 107. *Carabajal M.A., Viarengo G., Yim L., Martínez-Sanguiné A., Mariscotti J.F., Chabalgoity J.A., Rasia R.M., Vescovi E.G.* // *Sci. Signal.* 2020. V. 13. № 628. P. eaaz3334.
<https://doi.org/10.1126/scisignal.aaz3334>
 108. *Grossman S., Soukarieh F., Richardson W., Liu R., Mashabi A., Emsley J., Williams P., Camara M., Stocks M.J.* // *Eur. J. Med. Chem.* 2020. V. 208. P. 112778.
<https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112778>
 109. *Schütz C., Empting M.* // *Beilstein J. Org. Chem.* 2018. V. 14. № 1. P. 2627–2645.
<https://doi.org/10.3762/bjoc.14.241>

110. Soukarieh F., Williams P., Stocks M.J., Camara M. // *J. Med. Chem.* 2018. V. 61. № 23. P. 10385–10402. <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.8b00540>
111. Rasapalli S., Murphy Z.F., Sammeta V.R., Golen J.A., Weig A.W., Melander R.J., Melander C., Macha P., Vasudev M.C. // *Bioorganic Med. Chem. Lett.* 2020. V. 30. № 23. P. 127550. <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127550>
112. Pereira M.D.F., Chevrot R., Rosenfeld E., Thiery V., Besson T. // *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* 2007. V. 22. № 5. P. 225–233. <https://doi.org/10.1007/s00044-012-0004-3>
113. Zayed M.F., Ibrahim S.R.M., Habib E.S.E., Hassan M.H., Ahmed S., Rateb H.S. // *Med. Chem.* 2019. V. 15. № 6. P. 659–675. <https://doi.org/10.2174/1573406414666181109092944>
114. Poojari S., Naik P.P., Krishnamurthy G., Kumara J.K.S., Kumar N.S., Naik S. // *J. Taibah. Univ. Sci.* 2017. V. 11. P. 497–511. <https://doi.org/10.1016/j.jtusci.2016.10.003>
115. Mazumdar K., Dastidar S.G., Park J.H., Dutta N.K. // *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 2009. V. 28. № 8. P. 881–891. <https://doi.org/10.1007/s10096-009-0739-z>
116. Laddha S.S., Wadodkar S.G., Meghal S.K. // *ARKIVOC.* 2006. V. 11. P. 1–20.
117. Auti P.S., George G., Paul A.T. // *RSC Adv.* 2020. V. 10. № 68. P. 41353–41392. <https://doi.org/10.1039/D0RA06642G>
118. Maddali N.K., Viswanath I.V.K., Murthy Y.L.N., Bera R., Takhi M., Rao N.S., Gudla V. // *Med. Chem. Res.* 2019. V. 28. P. 559–629. <https://doi.org/10.1007/s00044-019-02313-9>
119. Mason J.I., Murry B.A., Olcott M., Sheets J.J. // *Biochem. Pharmacol.* 1985. V. 34. № 7. P. 1087–1092. [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(85\)90613-6](https://doi.org/10.1016/0006-2952(85)90613-6)

BIOCHEMICAL BASIS OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF QUINAZOLINONE DERIVATIVES IN THE LIGHT OF INSIGHTS INTO THE FEATURES OF THE CHEMICAL STRUCTURE AND WAYS OF BINDING TO TARGET MOLECULES. A REVIEW

M. A. Samotrueva^a, A. A. Starikova^{b,#}, O. A. Bashkina^a, A. A. Tsibizova^a, A. V. Borisov^b, D. V. Merezhkina^b, I. N. Tyurenkov^b, and A. A. Ozerov^{b,c}

^a*Astrakhanskiy State Medical University, 414000 Astrakhan, Russian Federation*

^b*Volgograd State Medical University, 400131 Volgograd, Russian Federation*

^c*Volgograd Medical Scientific Center, 400131 Volgograd, Russian Federation*

[#]*E-mail: alhimik.83@mail.ru*

The review characterizes the role of the main targets of antibacterial agents: “efflux pumps”; enzymes (DNA-hyruases as a subclass of topoisomerases, homoserine transacetylase, various classes of sorbitases, aromatics, lipoteichoyl synthase, polyketide synthase, pantothenate synthetase, acetyl-CoA carboxylase, sensory histidine kinase, kinase, cyclooxygenase, *etc.*); penicillin-binding protein; quorum signaling and adhesin systems in important biochemical processes of pathogen maintenance and virulence manifestation. The possibility of manifestation of antimicrobial effect by the substance upon its binding to the protein molecules responsible for pathogenicity of a microorganism was shown. The role of quinazolinone derivatives exhibiting high reactivity, stability in chemical processes and characterized by a wide spectrum of pharmacological activity including antimicrobial activity with respect to various gram-positive and gram-negative bacteria was determined. It has been shown that changes in the compound structure through the introduction of different substituents modify the degree of hydrophilicity and, as a result, determine a different degree of drug penetration through the cell membrane; the ability to form intermediate complex compounds stabilized by hydrogen bonds and van der Waals and stacking interactions with enzymatic targets as well as receptor-regulator proteins and signaling systems of pathogen cells. The results on prediction of the mechanism of action of the compounds synthesized by the authors of the article by methods of mathematical modeling are presented. The possibility of creating combined structures based on the quinazolinone core with various heterocyclic derivatives as a product with a pronounced antimicrobial activity is assessed. The considered regularities are of practical importance for the specialists in the field of medicinal chemistry, organic synthesis, biotechnology, clinical pharmacology, pharmaceutical chemistry and technology whose efforts are aimed at obtaining a new drug substance.

Keywords: antibacterial targets, efflux pumps, penicillin-binding protein, quorum signal systems, quinazolinone derivatives