

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

УДК 517.968.78

НАЧАЛЬНО-КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ПАМЯТЬЮ В ТРЁХМЕРНОЙ СЕТЕПОДОБНОЙ ОБЛАСТИ

© 2023 г. Е. С. Барановский

Рассматривается начально-краевая задача для интегро-дифференциальной системы, описывающей трёхмерное течение ньютоновской жидкости с памятью в сетеподобной области. При постановке задачи используются краевые условия Дирихле для поля скоростей и давления, а также условия трансмиссии типа Кирхгофа во внутренних узлах сети. Доказана теорема о существовании и единственности непрерывного по времени слабого решения. Кроме того, выведено энергетическое равенство, которому удовлетворяет это решение.

DOI: 10.31857/S0374064123040076, EDN: ANHXKP

1. Введение и постановка задачи. В последние годы интенсивно развивается теория уравнений в частных производных на сетях (геометрических графах), стратифицированных множествах и сетеподобных областях. Эта теория находит разнообразные приложения, в частности, применяется при математическом анализе процессов тепло- и массопереноса в областях со сложной геометрической структурой [1–3].

В большинстве гидродинамических моделей с сетеподобной областью течения в качестве уравнений движения используются классические уравнения Навье–Стокса или некоторые их упрощения. Эти уравнения выводятся на основе гипотезы о линейной связи между тангенциальным напряжением и скоростью сдвига. Данная гипотеза, называемая *законом вязкого трения Ньютона*, подтверждается для большинства низкомолекулярных жидкостей. Однако при изучении динамики высокомолекулярных соединений и сред, склонных к структурообразованию, обнаружены различные отклонения от “ньютоновского” поведения [4, 5]. Жидкости, не подчиняющиеся при своем течении закону трения Ньютона, принято называть *неньютоновскими*. К ним относятся, например, жидкости с памятью [6, 7], реологические характеристики которых зависят от предыстории деформаций и напряжений. В соответствующих реологических моделях содержатся некоторые интегралы по времени с интервалами от нуля (либо даже от $-\infty$) до текущего момента времени. Это определяет актуальность исследований интегро-дифференциальных уравнений, заданных на сетевых носителях.

В настоящей статье изучается линейная интегро-дифференциальная система, возникающая при моделировании течения неньютоновской жидкости с памятью в трёхмерной сетеподобной области $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$, где

$$\mathcal{P} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i=1}^N \mathcal{P}_i, \quad \mathcal{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{j=1}^M \mathcal{Q}_j;$$

\mathcal{P}_i и \mathcal{Q}_j – ограниченные локально-липшицевы области в \mathbb{R}^3 , причём

$$\mathcal{P}_i \cap \mathcal{Q}_j = \emptyset \quad \text{для любых } i = \overline{1, N}, \quad j = \overline{1, M};$$

$$\overline{\mathcal{P}_i} \cap \overline{\mathcal{P}_k} = \emptyset \quad \text{для любых } i, k = \overline{1, N}, \quad i \neq k;$$

$$\overline{\mathcal{Q}_j} \cap \overline{\mathcal{Q}_l} = \emptyset \quad \text{для любых } j, l = \overline{1, M}, \quad j \neq l.$$

Заметим, что множество $\tilde{\mathcal{P}}$ можно рассматривать как модель трубопроводной сети [8], предполагая, что $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_N$ – трубы, а $\mathcal{Q}_1, \dots, \mathcal{Q}_M$ – узловые места (узлы), в которых соединяются трубы.

Предположим, что граница каждого узла Q_j , $j = \overline{1, M}$, имеет лишь одну связную компоненту и существуют ровно m_j областей $P_{j_1}, P_{j_2}, \dots, P_{j_{m_j}}$, $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_{m_j} \leq N$, таких, что $\overline{Q_j} \cap \overline{P_{j_k}} \neq \emptyset$ для каждого $k = \overline{1, m_j}$.

Через Υ обозначим множество j таких, что $m_j \geq 2$. Если $j \in \Upsilon$, будем говорить, что Q_j – *внутренний узел*. В случае когда $j \in \{1, \dots, M\} \setminus \Upsilon$, узел Q_j будем называть *внешним узлом*.

Пусть $\Pi_{j_n} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{Q_j} \cap \overline{P_{j_n}}$ – поверхность примыкания трубы P_{j_n} к узлу Q_j . Предположим, что Π_{j_n} – плоская поверхность и для каждой области P_i существуют ровно два узла Q_{i_1} и Q_{i_2} таких, что

$$\overline{P_i} \cap \overline{Q_{i_1}} \neq \emptyset, \quad \overline{P_i} \cap \overline{Q_{i_2}} \neq \emptyset.$$

Тогда для каждого $i = \overline{1, N}$ однозначно определена пара чисел (i'_1, i'_2) такая, что

$$\overline{P_i} \cap \overline{Q_{i_1}} = \Pi_{i_1 i'_1}, \quad \overline{P_i} \cap \overline{Q_{i_2}} = \Pi_{i_2 i'_2}.$$

Через Γ_i обозначим боковую поверхность трубы P_i , $i = \overline{1, N}$, т.е.

$$\Gamma_i \stackrel{\text{def}}{=} \partial P_i \setminus (\Pi_{i_1 i'_1} \cup \Pi_{i_2 i'_2}).$$

Введём также следующие обозначения: $\Pi \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i=1}^N (\Pi_{i_1 i'_1} \cup \Pi_{i_2 i'_2})$ – объединение поверхностей примыкания труб к узлам, $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i=1}^N \Gamma_i$ – объединение боковых поверхностей труб.

Пусть $\mathbf{n}: \Pi \rightarrow \mathbb{R}^3$ – вектор-функция такая, что

$$\mathbf{n}|_{\Pi_{i_1 i'_1} \cup \Pi_{i_2 i'_2}} = \mathbf{n}_i|_{\Pi_{i_1 i'_1} \cup \Pi_{i_2 i'_2}}, \quad i = \overline{1, N},$$

где $\mathbf{n}_i = \mathbf{n}_i(\mathbf{x})$ – внешняя (по отношению к области P_i) единичная нормаль к поверхности ∂P_i в точке $\mathbf{x} \in \partial P_i$.

Рассмотрим начально-краевую задачу, описывающую течение несжимаемой неньютоновской жидкости с памятью через систему труб \mathcal{P} на промежутке времени $[0, T]$:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} - \eta \nabla^2 \mathbf{u} - \int_0^t \beta(s, t) \nabla^2 \mathbf{u}(\cdot, s) ds + \nabla \pi = \mathbf{f} \quad \text{в } \mathcal{P} \times (0, T), \tag{1}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{в } \mathcal{P} \times (0, T), \tag{2}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \text{на } \Gamma \times (0, T), \tag{3}$$

$$\mathbf{u}_{\text{tan}} = \mathbf{0}, \quad \pi = -\zeta + C \quad \text{на } \Pi \times (0, T), \tag{4}$$

$$\mathbf{u}(\cdot, 0) = \mathbf{u}_0 \quad \text{в } \mathcal{P}, \tag{5}$$

$$\sum_{k=1}^{m_j} \int_{\Pi_{jk}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} d\Pi = 0 \quad \text{для каждого } j \in \Upsilon, \tag{6}$$

где $\mathbf{u}: \mathcal{P} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ – скорость течения жидкости; $\pi: \mathcal{P} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ – давление; η – коэффициент вязкости ($\eta > 0$); $\beta: [0, T] \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}_+$ – функция памяти (ядро вязкоупругости), $\mathbb{R}_+ \stackrel{\text{def}}{=} [0, \infty)$; $\mathbf{f}: \mathcal{P} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ – поле внешних сил; функция $\zeta: \Pi \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ описывает давление на компонентах Π ; $\mathbf{u}_0: \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}^3$ – поле скоростей в начальный момент времени; \mathbf{u}_{tan} – касательная составляющая вектора \mathbf{u} , т.е. по определению $\mathbf{u}_{\text{tan}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$; символы ∇ и div обозначают соответственно градиент и дивергенцию по пространственным переменным x_1, x_2, x_3 ; $\nabla^2 \stackrel{\text{def}}{=} \nabla \cdot \nabla$ – оператор Лапласа. Для упрощения предполагается, что

плотность жидкости равна единице. Произвольная константа C во втором равенстве из (4) отражает факт, что при задании давления важен только его перепад [9].

Соотношение (1) – это уравнение нестационарного движения вязкой жидкости с памятью в стоковом приближении, т.е. без учёта конвективных ускорений. В частном случае, когда $\beta(s, t) \equiv 0$, приходим к линеаризованным эволюционным уравнениям Навье–Стокса [2]. Если $\beta(s, t) \equiv b \exp(-a(t - s))$, где $a > 0$ и $b > 0$, то система (1), (2) сводится к линеаризованным уравнениям движения несжимаемой вязкоупругой жидкости типа Олдройда [10–12]. Мы не будем ограничиваться конкретным выбором функции памяти – рассмотрим общую ситуацию, предполагая только, что функция β является неотрицательной и непрерывной.

Отметим, что равенство (2) выражает свойство несжимаемости жидкости, а краевое условие (3) означает, что жидкость прилипает к боковым стенкам труб. Наряду с условием прилипания, в моделях неньютоновской гидродинамики также широко используются различные условия пристенного проскальзывания (см., например, [13–15]). Краевые условия (4) задают касательную составляющую вектора скорости и давление на участках примыкания труб к узлам. Равенства (6) – это условия трансмиссии типа Кирхгофа, обеспечивающие выполнение закона сохранения массы во внутренних узлах сети.

Основная цель настоящей статьи – доказать однозначную разрешимость начально-краевой задачи (1)–(6) в слабой постановке. Работа организована следующим образом. В п. 2 рассматриваются необходимые функциональные пространства и вводится определение слабого решения. В п. 3 сформулирован основной результат работы – теорема о существовании и единственности непрерывного по времени слабого решения при естественных допущениях относительно данных задачи, а также приводится энергетическое равенство, которому удовлетворяет слабое решение. В п. 4 установлены некоторые вспомогательные результаты, в частности, получены оценки норм слабого решения в пространствах $L^\infty(0, T; L^2(\mathcal{P}))$ и $L^2(0, T; W^{1,2}(\mathcal{P}))$. Доказательству теоремы существования и единственности посвящён последний пункт.

2. Слабая формулировка задачи. Через $\mathcal{V}_\Pi(\mathcal{P})$ обозначим множество вектор-функций $\boldsymbol{\nu}: \overline{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{R}^3$ таких, что $\boldsymbol{\nu}|_{\overline{\mathcal{P}}_i} \in C^\infty(\overline{\mathcal{P}}_i) \stackrel{\text{def}}{=} C^\infty(\overline{\mathcal{P}}_i) \times C^\infty(\overline{\mathcal{P}}_i) \times C^\infty(\overline{\mathcal{P}}_i)$, $i = \overline{1, N}$, $\operatorname{div} \boldsymbol{\nu} = 0$ в \mathcal{P} , $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{0}$ на Γ , $\boldsymbol{\nu}_{\tan} = \mathbf{0}$ на Π и для каждого $j \in \Upsilon$ выполнено равенство

$$\sum_{k=1}^{m_j} \int_{\Pi_{jk}} \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{n} \, d\Pi = 0.$$

Обозначим через $\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})$ замыкание множества $\mathcal{V}_\Pi(\mathcal{P})$ в декартовом произведении пространств Лебега $L^2(\mathcal{P}) \stackrel{\text{def}}{=} L^2(\mathcal{P}) \times L^2(\mathcal{P}) \times L^2(\mathcal{P})$, а через $\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})$ – замыкание $\mathcal{V}_\Pi(\mathcal{P})$ в декартовом произведении пространств Соболева $\mathbf{W}^{1,2}(\mathcal{P}) \stackrel{\text{def}}{=} W^{1,2}(\mathcal{P}) \times W^{1,2}(\mathcal{P}) \times W^{1,2}(\mathcal{P})$.

В пространствах $\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})$ и $\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})$ введём скалярные произведения и нормы по формулам

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w})_{\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathcal{P}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \, dx, \quad \|\mathbf{v}\|_{\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})} \stackrel{\text{def}}{=} (\mathbf{v}, \mathbf{v})_{\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})}^{1/2},$$

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w})_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathcal{P}} \nabla \mathbf{v} : \nabla \mathbf{w} \, dx, \quad \|\mathbf{v}\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})} \stackrel{\text{def}}{=} (\mathbf{v}, \mathbf{v})_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^{1/2},$$

где символ “:” используется для обозначения скалярного произведения 3×3 -матриц.

Поскольку $\operatorname{meas}(\Gamma_i) > 0$, $i = \overline{1, N}$, то из следующей леммы вытекает, что скалярное произведение $(\cdot, \cdot)_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}$ определено корректно, а норма $\|\cdot\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}$ эквивалентна норме $\|\cdot\|_{\mathbf{W}^{1,2}(\mathcal{P})}$.

Лемма 1 [16, § II.5]. Пусть Ω – ограниченная область в \mathbb{R}^3 с локально-липшицевой границей $\partial\Omega$. Если $S \subset \partial\Omega$ и $\operatorname{meas}(S) > 0$, то существует константа $K_0 = K_0(\Omega, S)$ такая, что

$$\|\omega\|_{L^2(\Omega)} \leq K_0(\Omega, S) \left(\|\nabla \omega\|_{L^2(\Omega)} + \int_S |\omega| \, dS \right), \quad \omega \in W^{1,2}(\Omega).$$

Будем предполагать, что выполнены следующие два условия:

(i) функция $\beta: [0, T] \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}_+$ непрерывна;

(ii) выполнены включения: $\mathbf{f} \in \mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{L}^2(\mathcal{P}))$, $\zeta \in L^2(0, T; L^2(\Pi))$ и $\mathbf{u}_0 \in \mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})$.

Лемма 2. Если пара (\mathbf{u}, π) – классическое решение начально-краевой задачи (1)–(6), то выполняется равенство

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} + \eta(\nabla \mathbf{u}, \nabla \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} + \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v} \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} = \\ = \int_{\Pi} \zeta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi + (\mathbf{f}, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \end{aligned} \quad (7)$$

для любой вектор-функции $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})$ и любого $t \in [0, T]$.

Доказательство. Умножим обе части равенства (1) на вектор-функцию \mathbf{v} скалярно в пространстве $\mathbf{L}^2(\mathcal{P})$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}, \mathbf{v} \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} - \underbrace{\eta(\nabla^2 \mathbf{u}, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}}_{=J_1} - \underbrace{\left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla^2 \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \mathbf{v} \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}}_{=J_2} + \\ + \underbrace{(\nabla \pi, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}}_{=J_3} = (\mathbf{f}, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}. \end{aligned} \quad (8)$$

Используя интегрирование по частям, получаем

$$\begin{aligned} J_1 = \eta \int_{\mathcal{P}} \nabla^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} d\mathbf{x} = \eta \sum_{i,j=1}^3 \int_{\mathcal{P}} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} v_i d\mathbf{x} = \eta \sum_{i,j=1}^3 \int_{\Pi} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} v_i n_j d\Pi - \eta \sum_{i,j=1}^3 \int_{\mathcal{P}} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} d\mathbf{x} = \\ = \eta \int_{\Pi} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{n}} \cdot \mathbf{v} d\Pi - \eta \int_{\mathcal{P}} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} d\mathbf{x} = \eta \int_{\Pi} \frac{\partial(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})}{\partial \mathbf{n}} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) d\Pi - \eta \int_{\mathcal{P}} \nabla \mathbf{u} : \nabla \mathbf{v} d\mathbf{x}. \end{aligned} \quad (9)$$

Кроме того, так как $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ в $\mathcal{P} \times (0, T)$ и $\mathbf{u}_{\tan} = \mathbf{0}$ на $\Pi \times (0, T)$, то $\partial(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})/\partial \mathbf{n} = 0$ на $\Pi \times (0, T)$. Поэтому из (9) следует, что

$$J_1 = -\eta(\nabla \mathbf{u}, \nabla \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}. \quad (10)$$

Аналогично получаем

$$J_2 = - \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v} \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}. \quad (11)$$

Далее, применяя интегрирование по частям, с учётом равенства $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ в \mathcal{P} находим

$$\begin{aligned} J_3 = \int_{\mathcal{P}} \nabla \pi \cdot \mathbf{v} d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 \int_{\mathcal{P}} \frac{\partial \pi}{\partial x_i} v_i d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^3 \int_{\Pi} \pi v_i n_i d\Pi - \sum_{i=1}^3 \int_{\mathcal{P}} \pi \frac{\partial v_i}{\partial x_i} d\mathbf{x} = \\ = \int_{\Pi} \pi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi - \int_{\mathcal{P}} \pi \operatorname{div} \mathbf{v} d\mathbf{x} = \int_{\Pi} \pi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi, \end{aligned}$$

откуда, принимая во внимание краевое условие $\pi = -\zeta + C$ на $\Pi \times (0, T)$, выводим следующее равенство:

$$J_3 = - \int_{\Pi} \zeta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi + C \int_{\Pi} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi. \tag{12}$$

Нетрудно видеть, что

$$\int_{\Pi} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi = \int_{\mathcal{P}} \operatorname{div} \mathbf{v} d\mathbf{x} = 0,$$

поэтому формула (12) упрощается и принимает вид

$$J_3 = - \int_{\Pi} \zeta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi. \tag{13}$$

Наконец, подставляя (10), (11) и (13) в равенство (8), приходим к соотношению (7). Лемма доказана.

Лемма 2 приводит к следующему определению.

Определение. Слабым решением начально-краевой задачи (1)–(6) будем называть вектор-функцию $\mathbf{u}: \mathcal{P} \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ такую, что

$$\mathbf{u} \in L^2(0, T; \mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})) \cap C([0, T]; \mathbf{H}_{\Pi}(\mathcal{P})), \quad \mathbf{u}(\cdot, 0) = \mathbf{u}_0$$

и выполнено равенство (7) в смысле скалярных распределений на интервале $(0, T)$.

Через $\mathbf{U}(\beta, \mathbf{f}, \zeta, \mathbf{u}_0)$ обозначим множество слабых решений задачи (1)–(6). Ниже будет показано, что это множество состоит из единственного элемента при естественных допущениях относительно данных β , \mathbf{f} , ζ и \mathbf{u}_0 .

3. Основной результат работы.

Теорема. Пусть выполнены условия (i) и (ii). Тогда начально-краевая задача (1)–(6) имеет единственное слабое решение \mathbf{u} и для него справедливо энергетическое равенство

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{u}(\cdot, \tau)\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + 2\eta \int_0^{\tau} \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 dt + 2 \int_0^{\tau} \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{u}(\cdot, t) \right)_{L^2(\mathcal{P})} dt = \\ & = \|\mathbf{u}_0\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + 2 \int_0^{\tau} \int_{\Pi} \zeta(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d\Pi dt + 2 \int_0^{\tau} (\mathbf{f}(\cdot, t), \mathbf{u}(\cdot, t))_{L^2(\mathcal{P})} dt, \quad \tau \in [0, T]. \end{aligned} \tag{14}$$

Доказательство этой теоремы приводится в п. 5.

4. Вспомогательные результаты. Нам понадобятся следующие две леммы.

Лемма 3. Пусть \mathbf{X} и \mathbf{Y} – гильбертовы пространства и имеет место цепочка вложений

$$\mathbf{X} \hookrightarrow \mathbf{Y} \simeq \mathbf{Y}^* \hookrightarrow \mathbf{X}^*,$$

где каждое пространство плотно в последующем пространстве и вложения непрерывны. Если функция ψ принадлежит пространству $L^2(0, T; \mathbf{X})$, а её обобщённая производная $d\psi/dt$ принадлежит пространству $L^2(0, T; \mathbf{X}^*)$, то функция ψ почти всюду равна некоторой непрерывной функции из отрезка $[0, T]$ в \mathbf{Y} и, кроме того, справедливо равенство

$$\frac{d}{dt} \|\psi\|_{\mathbf{Y}}^2 = 2 \left\langle \frac{d\psi}{dt}, \psi \right\rangle_{\mathbf{X}^* \times \mathbf{X}}$$

почти всюду на $(0, T)$, где скобки $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{X}^* \times \mathbf{X}}$ обозначают отношение двойственности между пространством \mathbf{X} и сопряжённым пространством \mathbf{X}^* .

Доказательство этой леммы приводится в монографии [17, гл. III, § 1].

Пусть $\gamma_\Pi: \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}) \rightarrow \mathbf{L}^2(\Pi)$ – линейный непрерывный оператор такой, что $\gamma_\Pi \boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\nu}|_\Pi$ для любой вектор-функции $\boldsymbol{\nu} \in \mathcal{V}_\Pi(\mathcal{P})$. Существование, единственность и непрерывность оператора γ_Π , называемого *оператором следа*, вытекает из классических результатов о следах функций, принадлежащих пространствам Соболева (см., например, [18, § 2.4]).

Лемма 4. *Если $\mathbf{u} \in \mathbf{U}(\beta, \mathbf{f}, \zeta, \mathbf{u}_0)$, то справедлива следующая оценка:*

$$\begin{aligned} & \max_{\tau \in [0, T]} \left(\|\mathbf{u}(\cdot, \tau)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^\tau \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 ds \right) \leq \\ & \leq e^{K(\beta, T, \eta)T} \left(\|\mathbf{u}_0\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \frac{\|\mathbf{f}\|_{\mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{L}^2(\mathcal{P}))}^2}{K(\beta, T, \eta)} + \frac{2\|\gamma_\Pi\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 \|\zeta\|_{\mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{L}^2(\Pi))}^2}{\eta} \right), \end{aligned} \tag{15}$$

где

$$K(\beta, T, \eta) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2}{\eta^2} \max_{t \in [0, T]} \int_0^t \beta^2(s, t) ds + 1 > 0.$$

Доказательство. Отождествляя пространства $\mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P})$ и сопряжённое к нему $\mathbf{H}_\Pi^*(\mathcal{P})$ в соответствии с теоремой представления Рисса, приходим к цепочке вложений

$$\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}) \hookrightarrow \mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P}) \simeq \mathbf{H}_\Pi^*(\mathcal{P}) \hookrightarrow \mathbf{V}_\Pi^*(\mathcal{P}).$$

Заметив, что имеет место включение

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} \in \mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_\Pi^*(\mathcal{P})),$$

и применив лемму 3 в предположении, что

$$\mathbf{X} = \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}), \quad \mathbf{Y} = \mathbf{H}_\Pi(\mathcal{P}), \quad \boldsymbol{\psi} = \mathbf{u},$$

получаем, что почти всюду на $(0, T)$ выполнено равенство

$$\frac{d}{dt} \|\mathbf{u}\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 = 2 \left\langle \frac{d\mathbf{u}}{dt}, \mathbf{u} \right\rangle_{\mathbf{V}_\Pi^*(\mathcal{P}) \times \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}. \tag{16}$$

Поскольку \mathbf{u} – слабое решение начально-краевой задачи (1)–(6), то

$$\begin{aligned} & \left\langle \frac{d\mathbf{u}}{dt}, \mathbf{v} \right\rangle_{\mathbf{V}_\Pi^*(\mathcal{P}) \times \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})} + \eta (\nabla \mathbf{u}, \nabla \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} + \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v} \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} = \\ & = \int_\Pi \zeta \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\Pi + (\mathbf{f}, \mathbf{v})_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \end{aligned} \tag{17}$$

для любой вектор-функции $\mathbf{v} \in \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})$.

Подставляя $\mathbf{v} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{u}(\cdot, t)$ в (17) и принимая во внимание (16), приходим к равенству

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + 2\eta \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 + 2 \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{u}(\cdot, t) \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} = \\ & = 2 \int_\Pi \zeta(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) d\Pi + 2(\mathbf{f}(\cdot, t), \mathbf{u}(\cdot, t))_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}. \end{aligned} \tag{18}$$

Затем, применяя неравенства Гёльдера и Юнга, находим

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + 2\eta \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 &\leq \eta \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 + K(\beta, T, \eta) \eta \int_0^t \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds + \\ &+ \frac{2}{\eta} \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 \|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 + \frac{\|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2}{K(\beta, T, \eta)} + K(\beta, T, \eta) \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2. \end{aligned}$$

После элементарных преобразований получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 &\leq K(\beta, T, \eta) \left(\|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^t \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds \right) + \\ &+ \frac{2}{\eta} \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 \|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 + \frac{\|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2}{K(\beta, T, \eta)}. \end{aligned}$$

Проинтегрируем обе части последнего неравенства по t от 0 до τ :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}(\cdot, \tau)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^{\tau} \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds &\leq \\ &\leq \|\mathbf{u}_0\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + K(\beta, T, \eta) \int_0^{\tau} \left(\|\mathbf{u}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^t \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds \right) dt + \\ &+ \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \int_0^{\tau} \|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 dt + \frac{2\|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2}{\eta} \int_0^{\tau} \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 dt. \end{aligned}$$

Наконец, применив лемму Гронуолла–Беллмана, получим следующую оценку:

$$\begin{aligned} \max_{\tau \in [0, T]} \left(\|\mathbf{u}(\cdot, \tau)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^{\tau} \|\mathbf{u}(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds \right) &\leq \\ &\leq e^{K(\beta, T, \eta)T} \left(\|\mathbf{u}_0\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \int_0^T \|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 dt + \frac{2\|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2}{\eta} \int_0^T \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 dt \right), \end{aligned}$$

из которой и вытекает требуемое неравенство (15). Лемма доказана.

5. Доказательство теоремы. Для нахождения слабого решения \mathbf{u} построим последовательность приближённых решений $\{\mathbf{u}_m\}_{m=1}^{\infty}$ по методу Фаэдо–Галёркина, а затем осуществим предельный переход при $m \rightarrow \infty$, используя равномерную ограниченность норм $\{\|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}))}\}_{m=1}^{\infty}$.

Приближённые решения будем искать в виде сумм:

$$\mathbf{u}_m(\mathbf{x}, t) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=1}^m g_{mj}(t) \mathbf{v}_j(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{P}, \quad t \in (0, T),$$

где $g_{mj}: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ – неизвестные функции и $\{\mathbf{v}_j\}_{j=1}^{\infty}$ – полная последовательность в $\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})$, образующая ортонормированный базис в $\mathbf{H}_{\Pi}(\mathcal{P})$.

Зафиксируем произвольное натуральное число m . Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t}, \mathbf{v}_k \right)_{L^2(\mathcal{P})} + \eta (\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{v}_k)_{L^2(\mathcal{P})} + \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}_m(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v}_k \right)_{L^2(\mathcal{P})} = \\ = \int_{\Pi} \zeta \mathbf{v}_k \cdot \mathbf{n} d\Pi + (\mathbf{f}, \mathbf{v}_k)_{L^2(\mathcal{P})}, \quad t \in (0, T), \quad k = \overline{1, m}, \end{aligned} \quad (19)$$

$$\mathbf{u}_m(\mathbf{x}, 0) = \sum_{k=1}^m (\mathbf{u}_0, \mathbf{v}_k)_{L^2(\mathcal{P})} \mathbf{v}_k(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{P}. \quad (20)$$

Линейная интегро-дифференциальная система (19) с начальным условием (20) единственным образом определяет функции g_{mk} на всём отрезке $[0, T]$. Выведем независящие от параметра m оценки решений задачи (19), (20).

Предположим, что вектор-функция \mathbf{u}_m удовлетворяет (19) и (20). Умножим обе части (19) на $g_{mk}(t)$. Складывая полученные равенства по $k = \overline{1, m}$, имеем

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{u}_m}{\partial t}, \mathbf{u}_m \right)_{L^2(\mathcal{P})} + \eta (\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{u}_m)_{L^2(\mathcal{P})} + \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}_m(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{u}_m \right)_{L^2(\mathcal{P})} = \\ = \int_{\Pi} \zeta \mathbf{u}_m \cdot \mathbf{n} d\Pi + (\mathbf{f}, \mathbf{u}_m)_{L^2(\mathcal{P})}, \quad t \in (0, T). \end{aligned} \quad (21)$$

Умножим обе части равенства (21) на 2. С помощью элементарных преобразований приходим к следующему равенству:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + 2\eta \|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 + 2 \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}_m(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{u}_m \right)_{L^2(\mathcal{P})} = \\ = 2 \int_{\Pi} \zeta \mathbf{u}_m \cdot \mathbf{n} d\Pi + 2(\mathbf{f}, \mathbf{u}_m)_{L^2(\mathcal{P})}, \quad t \in (0, T). \end{aligned}$$

Затем, применяя неравенства Гёльдера и Юнга, получаем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + 2\eta \|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 \leq \\ \leq \eta \|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 + K(\beta, T, \eta) \eta \int_0^t \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds + \frac{2}{\eta} \|\zeta\|_{L^2(\Pi)}^2 \|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), L^2(\Pi))}^2 + \\ + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \|\mathbf{f}\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + K(\beta, T, \eta) \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(\mathcal{P})}^2, \quad t \in (0, T), \end{aligned}$$

откуда следует, что

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\mathbf{u}_m\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 \leq K(\beta, T, \eta) \left(\|\mathbf{u}_m\|_{L^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^t \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})}^2 ds \right) + \\ + \frac{2}{\eta} \|\zeta\|_{L^2(\Pi)}^2 \|\gamma_{\Pi}\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P}), L^2(\Pi))}^2 + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \|\mathbf{f}\|_{L^2(\mathcal{P})}^2, \quad t \in (0, T). \end{aligned} \quad (22)$$

Проинтегрируем обе части неравенства (22) по t от 0 до τ :

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{u}_m(\cdot, \tau)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^\tau \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 ds \leq \\ & \leq \|\mathbf{u}_m(\cdot, 0)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + K(\beta, T, \eta) \int_0^\tau \left(\|\mathbf{u}_m(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^t \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 ds \right) dt + \\ & + \frac{2}{\eta} \|\gamma_\Pi\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 \int_0^\tau \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 dt + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \int_0^\tau \|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 dt. \end{aligned}$$

Из последнего неравенства с помощью леммы Гронвуолла–Беллмана выводим оценку

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{u}_m(\cdot, \tau)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^\tau \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 ds \leq \\ & \leq e^{K(\beta, T, \eta)\tau} \left(\|\mathbf{u}_m(\cdot, 0)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \frac{2}{\eta} \|\gamma_\Pi\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 \int_0^\tau \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 dt + \right. \\ & \left. + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \int_0^\tau \|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 dt \right). \end{aligned} \tag{23}$$

Полагая $\tau = T$ в (23) и принимая во внимание соотношения

$$\|\mathbf{u}_m(\cdot, 0)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 = \sum_{k=1}^m (\mathbf{u}_0, \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 \leq \|\mathbf{u}_0\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2, \quad m \in \mathbb{N},$$

получаем оценку

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{u}_m(\cdot, T)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \eta \int_0^T \|\mathbf{u}_m(\cdot, s)\|_{\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})}^2 ds \leq \\ & \leq e^{K(\beta, T, \eta)T} \left(\|\mathbf{u}_0\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 + \frac{2}{\eta} \|\gamma_\Pi\|_{\mathcal{L}(\mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}), \mathbf{L}^2(\Pi))}^2 \int_0^T \|\zeta(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\Pi)}^2 dt + \right. \\ & \left. + \frac{1}{K(\beta, T, \eta)} \int_0^T \|\mathbf{f}(\cdot, t)\|_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})}^2 dt \right). \end{aligned} \tag{24}$$

Заметим, что правая часть неравенства (24) не зависит от m . Следовательно, имеет место равномерная по m ограниченность норм $\{\|\mathbf{u}_m\|_{\mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}))}\}_{m=1}^\infty$. Поэтому, переходя к подпоследовательности (если это необходимо), получаем, что

$$\mathbf{u}_m \rightarrow \mathbf{u} \text{ слабо в } \mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P})) \text{ при } m \rightarrow \infty \tag{25}$$

для некоторой вектор-функции \mathbf{u} из пространства $\mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_\Pi(\mathcal{P}))$.

Умножим обе части равенства (19) на произвольную C^∞ -гладкую функцию φ с носителем, содержащимся в интервале $(0, T)$, и проинтегрируем по t от 0 до T . Применив интегрирование по частям к первому слагаемому из левой части полученного равенства, приходим к соотношению

$$\begin{aligned} - \int_0^T (\mathbf{u}_m, \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi' dt + \eta \int_0^T (\nabla \mathbf{u}_m, \nabla \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt + \int_0^T \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}_m(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v}_k \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt = \\ = \int_0^T \left(\int_{\Pi} \zeta \mathbf{v}_k \cdot \mathbf{n} d\Pi \right) \varphi dt + \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt, \quad k = \overline{1, m}, \end{aligned} \quad (26)$$

где штрих обозначает классическую производную по t .

Принимая во внимание слабую сходимость (25), перейдём к пределу при $m \rightarrow \infty$ в равенстве (26) и в результате получим

$$\begin{aligned} - \int_0^T (\mathbf{u}, \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi' dt + \eta \int_0^T (\nabla \mathbf{u}, \nabla \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt + \int_0^T \left(\int_0^t \beta(s, t) \nabla \mathbf{u}(\cdot, s) ds, \nabla \mathbf{v}_k \right)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt = \\ = \int_0^T \left(\int_{\Pi} \zeta \mathbf{v}_k \cdot \mathbf{n} d\Pi \right) \varphi dt + \int_0^T (\mathbf{f}, \mathbf{v}_k)_{\mathbf{L}^2(\mathcal{P})} \varphi dt \end{aligned} \quad (27)$$

для каждого $k \in \mathbb{N}$. Поскольку $\{\mathbf{v}_j\}_{j=1}^\infty$ – полная последовательность в пространстве $\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})$, равенство (27) останется справедливым, если в нем заменить \mathbf{v}_k на произвольную вектор-функцию \mathbf{v} из пространства $\mathbf{V}_{\Pi}(\mathcal{P})$. Отсюда, в частности, следует включение

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} \in \mathbf{L}^2(0, T; \mathbf{V}_{\Pi}^*(\mathcal{P})).$$

Поэтому, снова используя лемму 3, получаем, что $\mathbf{u} \in \mathbf{C}([0, T]; \mathbf{H}_{\Pi}(\mathcal{P}))$.

Кроме того, с учётом соотношения (20) нетрудно проверить, что для вектор-функции \mathbf{u} выполнено начальное условие $\mathbf{u}(\cdot, 0) = \mathbf{u}_0$. Таким образом, установлено, что \mathbf{u} – слабое решение начально-краевой задачи (1)–(6).

Покажем теперь, что найденное нами слабое решение \mathbf{u} является единственным. Предположим, что

$$\mathbf{u}_*, \mathbf{u}_{**} \in \mathbf{U}(\beta, \mathbf{f}, \zeta, \mathbf{u}_0), \quad \tilde{\mathbf{u}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{u}_* - \mathbf{u}_{**}.$$

Очевидно, что имеет место включение $\tilde{\mathbf{u}} \in \mathbf{U}(\beta, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$. Тогда, согласно лемме 4, получаем, что $\tilde{\mathbf{u}} \equiv \mathbf{0}$ и, следовательно, $\mathbf{u}_* \equiv \mathbf{u}_{**}$.

Наконец, интегрируя обе части равенства (18) по t от 0 до τ , выводим энергетическое равенство (14). Теорема доказана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Panasenko G., Pileckas K.* Flows in a tube structure: equation on the graph // J. of Math. Phys. 2014. V. 55. Art. ID 081505.
2. *Provotorov V.V., Provotorova E.N.* Optimal control of the linearized Navier–Stokes system in a netlike domain // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Прикл. математика. Информатика. Процессы управления. 2017. Т. 13. № 4. С. 431–443.
3. *Baranovskii E.S., Provotorov V.V., Artemov M.A., Zhabko A.P.* Non-isothermal creeping flows in a pipeline network: existence results // Symmetry. 2021. V. 13. № 7. Art. ID 1300.
4. *Astarita G., Marucci G.* Principles of Non-Newtonian Fluid Mechanics. New York, 1974.

5. *Cioranescu D., Girault V., Rajagopal K.R.* Mechanics and Mathematics of Fluids of the Differential Type. Cham, 2016.
6. *Брутян М.А., Крапивский П.Л.* Гидродинамика неньютоновских жидкостей // Итоги науки и техники. Сер. Комплексные и специальные разделы механики. 1991. Т. 4. С. 3–98.
7. *Saut J.-C.* Lectures on the mathematical theory of viscoelastic fluids // Lect. on the Analysis of Nonlinear Partial Differential Equations. Part 3. Somerville, 2013. P. 325–393.
8. *Baranovskii E.S.* A novel 3D model for non-Newtonian fluid flows in a pipe network // Math. Methods in the Appl. Sci. 2021. V. 44. № 5. P. 3827–3839.
9. *Рагулин В.В.* К задаче о протекании вязкой жидкости сквозь ограниченную область при заданном перепаде давления и напора // Динамика сплошной среды. 1976. Т. 27. С. 78–92.
10. *Oskolkov A.P., Shadiev R.* Towards a theory of global solvability on $[0, \infty)$ of initial-boundary value problems for the equations of motion of Oldroyd and Kelvin–Voight fluids // J. of Math. Sci. 1994. V. 68. P. 240–253.
11. *Oskolkov A.P.* Smooth global solutions of initial boundary-value problems for the equations of Oldroyd fluids and of their ϵ -approximations // J. of Math. Sci. 1998. V. 89. P. 1750–1763.
12. *Bir B., Goswami D.* On a three step two-grid finite element method for the Oldroyd model of order one // ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 2021. Bd. 101. № 11. Art. ID e202000373.
13. *Beirão da Veiga H.* On the regularity of flows with Ladyzhenskaya shear dependent viscosity and slip and non-slip boundary conditions // Comm. Pure Appl. Math. 2005. V. 58. P. 552–577.
14. *Baranovskii E.S., Artemov M.A.* Global existence results for Oldroyd fluids with wall slip // Acta Applicandae Mathematicae. 2017. V. 147. № 1. P. 197–210.
15. *Baranovskii E.S.* Steady flows of an Oldroyd fluid with threshold slip // Comm. on Pure and Appl. Anal. 2019. V. 18. № 2. P. 735–750.
16. *Galdi G.P.* An Introduction to the Mathematical Theory of the Navier–Stokes Equations. Steady-State Problems. New York, 2011.
17. *Temam R.* Navier–Stokes Equations. Theory and Numerical Analysis. Amsterdam; New York; Oxford, 1977.
18. *Nečas J.* Direct Methods in the Theory of Elliptic Equations. Heidelberg, 2012.

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 22.11.2021 г.

После доработки 21.02.2023 г.

Принята к публикации 24.02.2023 г.