

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВАХ РАЗЛИЧНОЙ ГЛАДКОСТИ ПО ПЕРЕМЕННЫМ

© 2023 г. А. В. Васильев, В. Б. Васильев

Рассмотрены модельное эллиптическое псевдодифференциальное уравнение и простейшие краевые задачи в квадранте в пространстве Соболева–Слободецкого различного порядка гладкости по переменным. В случае специального представления символа описано общее решение уравнения и рассмотрена простейшая краевая задача с условиями Дирихле и Неймана на сторонах угла. Указанная краевая задача сведена к системе интегральных уравнений, которая при дополнительных предположениях о структуре символа может быть сведена и к системе разностных уравнений первого порядка.

DOI: 10.31857/S0374064123060043, EDN: FFPYOH

Введение. Теория краевых задач для эллиптических псевдодифференциальных уравнений берет начало с середины 60-х гг. прошлого столетия, а именно с работ М.И. Вишика и Г.И. Эскина, результаты которых обобщены в монографии [1]. Полученные результаты привлекли внимание и получили дальнейшее развитие в работах ряда исследователей (см., например, [2, 3]). Второй автор данной статьи также проявил интерес к этой теме, предложив свой подход к построению теории краевых задач для эллиптических псевдодифференциальных уравнений в областях, имеющих на границе конические точки и ребра различных размерностей (см. [4, 5] и продолжение в работах [6–10]).

Все исследования проводились в обычных пространствах Соболева–Слободецкого, однако возможны пространства различного порядка гладкости по переменным [11–13]. Здесь мы рассматриваем простейший случай пространств Соболева–Слободецкого различного порядка гладкости по переменным и описываем сведение краевой задачи к системе интегральных уравнений.

1. Эллиптические уравнения. В этом пункте приведём некоторые определения и результаты, на которые будем опираться далее.

1.1. Пространства Соболева–Слободецкого различной гладкости. Следуя [14] (см. также [11]), введём удобные обозначения. Многомерное евклидово пространство \mathbb{R}^M представим в виде ортогональной суммы подпространств, в которых только некоторые из координат x_1, x_2, \dots, x_M отличны от нуля. Более точно, если $K \subset \{1, \dots, M\}$ – непустое множество, то полагаем

$$\mathbb{R}^K = \{x \in \mathbb{R}^M : x = (x_1, \dots, x_M), \quad x_j = 0 \text{ для любого } j \notin K\} \subset \mathbb{R}^M.$$

Пусть $K_1, K_2, \dots, K_n \subset \{1, 2, \dots, M\}$ – некоторые подмножества, так что

$$\bigcup_{j=1}^n K_j = \{1, 2, \dots, M\}, \quad K_i \cap K_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Тогда имеем представление

$$\mathbb{R}^M = \mathbb{R}^{K_1} \oplus \mathbb{R}^{K_2} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}^{K_n},$$

обозначая через x_{K_j} элемент пространства \mathbb{R}^{K_j} .

Для функций, определённых в пространстве \mathbb{R}^M , используем стандартное преобразование Фурье

$$\tilde{u}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^M} u(x)e^{ix \cdot \xi} dx, \quad \xi = (\xi_1, \dots, \xi_M).$$

Теперь определим пространство Соболева–Слободецкого $H^S(\mathbb{R}^M)$, для упрощения обозначив $S = (s_1, \dots, s_n)$ как гильбертово пространство со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_{\mathbb{R}^M} f(x)\overline{g(x)} dx$$

и нормой

$$\|f\|_S = \left(\int_{\mathbb{R}^M} (1 + |\xi_{K_1}|)^{2s_1} (1 + |\xi_{K_2}|)^{2s_2} \dots (1 + |\xi_{K_n}|)^{2s_n} |\tilde{f}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2}.$$

Такие H^S -пространства обладают стандартным набором свойств пространств Соболева–Слободецкого [11]. В частности, пространство $H^s(\mathbb{R}^M)$ получается при следующей подборке подмножеств K_j и параметров s_j :

$$K_1 = K_2 = \dots = K_{n-1} = \emptyset, \quad K_n = \{1, 2, \dots, M\}, \quad S = (0, 0, \dots, 0, s).$$

1.2. Модельное уравнение и разрешимость. В соответствии с локальным принципом сконцентрируем внимание на исследовании модельного псевдодифференциального уравнения с оператором, символ которого не зависит от пространственной переменной. Подробные доказательства приводимых здесь результатов содержатся в работе [15].

Псевдодифференциальный оператор A определяется формулой

$$(Au)(x) = \frac{1}{(2\pi)^M} \int_{\mathbb{R}^M} \int_{\mathbb{R}^M} e^{i(x-y) \cdot \xi} \tilde{A}(\xi) u(y) dy d\xi,$$

в которой заданная измеримая функция $\tilde{A}(\xi)$ называется *символом оператора* A .

Предположим, что символ $\tilde{A}(\xi)$ удовлетворяет условию

$$c_1 \prod_{j=1}^n (1 + |\xi_{K_j}|)^{\alpha_j} \leq |A(\xi)| \leq c_2 \prod_{j=1}^n (1 + |\xi_{K_j}|)^{\alpha_j}, \quad \alpha_j \in \mathbb{R}, \quad j = \overline{1, n}, \tag{1}$$

с положительными постоянными c_1 и c_2 .

Обозначим $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Лемма 1. Пусть A – псевдодифференциальный оператор с символом $\tilde{A}(\xi)$, удовлетворяющим условию (1). Тогда $A : H^S(\mathbb{R}^M) \rightarrow H^{S-\alpha}(\mathbb{R}^M)$ является линейным непрерывным оператором.

Простым следствием этой леммы является следующий факт. Если A – псевдодифференциальный оператор с символом $\tilde{A}(\xi)$, удовлетворяющим условию (1), то уравнение

$$(Au)(x) = v(x), \quad x \in \mathbb{R}^M, \tag{2}$$

с произвольной правой частью $v \in H^{S-\alpha}(\mathbb{R}^M)$ имеет единственное решение $u \in H^S(\mathbb{R}^M)$ и справедлива априорная оценка

$$\|u\|_S \leq \text{const} \|v\|_{S-\alpha}.$$

Отметим, что если рассматривать уравнение (2) не во всем пространстве \mathbb{R}^M , а в другой канонической области (тоже конусе), то такое простое следствие не имеет места. Здесь нас, как

и прежде [6–10, 16–23], будет интересовать случай выпуклого конуса, не содержащего целой прямой.

Пусть $C_{K_j} \subset \mathbb{R}^{K_j}$ – выпуклый конус, не содержащий целой прямой. Положим

$$C = C_{K_1} \times C_{K_2} \times \dots \times C_{K_n}.$$

Очевидно, что C – выпуклый конус в пространстве \mathbb{R}^M .

Теперь исследуем вопрос разрешимости в пространстве $H^S(C)$ уравнения

$$(Au)(x) = 0, \quad x \in C. \tag{3}$$

Приведём ниже определения и результаты, касающиеся разрешимости уравнения (3).

Определение 1. Пространство $H^S(C)$ состоит из (обобщённых) функций из $H^S(\mathbb{R}^M)$, носители которых содержатся в \overline{C} .

Обозначим через $\tilde{H}^S(C)$ фурье-образ пространства $H^S(C)$.

Определение 2. Радиальной трубчатой областью над конусом C называется область в многомерном комплексном пространстве \mathbb{C}^M следующего вида:

$$T(C) \equiv \{z \in \mathbb{C}^M : z = x + iy, \quad x \in \mathbb{R}^M, \quad y \in C\}.$$

Сопряжённым конусом C^* называется такой конус, для всех точек x которого выполняется условие

$$x \cdot y > 0 \quad \text{при всех } y \in C,$$

$x \cdot y$ обозначает скалярное произведение x и y .

Определение 3. Волновой факторизацией эллиптического символа $\tilde{A}(\xi)$ относительно конуса C называется его представление в виде

$$\tilde{A}(\xi) = A_{\neq}(\xi)A_{=}(\xi),$$

где множители $A_{\neq}(\xi)$, $A_{=}(\xi)$ должны удовлетворять следующим условиям:

- 1) $A_{\neq}(\xi)$, $A_{=}(\xi)$ определены для всех $\xi \in \mathbb{R}^M$, исключая, возможно, точки $\xi \in \partial C^*$;
- 2) $A_{\neq}(\xi)$, $A_{=}(\xi)$ допускают аналитическое продолжение в радиальные трубчатые области

$T(C^*)$, $T(-C^*)$ соответственно и удовлетворяют оценкам

$$|A_{\neq}^{\pm 1}(\xi + i\tau)| \leq c_1 \prod_{j=1}^n (1 + |\xi_{K_j}| + |\tau_{K_j}|)^{\pm \varkappa_j},$$

$$|A_{=}^{\pm 1}(\xi - i\tau)| \leq c_2 \prod_{j=1}^n (1 + |\xi_{K_j}| + |\tau_{K_j}|)^{\pm(\alpha_j - \varkappa_j)} \quad \text{для любого } \tau \in C^*, \quad \varkappa_j \in \mathbb{R}.$$

Вектор $\varkappa = (\varkappa_1, \dots, \varkappa_n)$ называется индексом волновой факторизации.

Замечание 1. Следует отметить, что определение 3 должно быть модифицировано, если какой-то конус C_{K_j} содержит целую прямую, точнее, имеет вид $\mathbb{R}^{m_j} \times C_{k_j - m_j}$, где $C_{k_j - m_j}$, $0 \leq m_j \leq k_j$, – выпуклый конус в $(k_j - m_j)$ -мерном пространстве, не содержащем целой прямой. Напомним, что по определению при $m_j = 0$ полагаем $\mathbb{R}^0 \times C_{k_j} \equiv C_{K_j}$, при $m_j = k_j$ соответственно $\mathbb{R}^{k_j} \times C_0 \equiv \mathbb{R}^{K_j}$. Обозначив $\sum_{j=1}^n m_j = Q$, можно определить Q -волновую факторизацию, где точки Q -мерного пространства $\mathbb{R}^Q = \mathbb{R}^{m_1} \times \dots \times \mathbb{R}^{m_n}$ будут играть роль параметров (см. [4]). Тогда определение 3 соответствует 0-волновой факторизации.

Теорема 1. Если символ $\tilde{A}(\xi)$ допускает волновую факторизацию относительно конуса C с индексом \varkappa таким, что $|\varkappa_j - s_j| < 1/2$, $j = \overline{1, n}$, то уравнение (3) в пространстве $H^S(C)$ имеет только нулевое решение.

Предполагаем, что для каждого конуса C_{K_j} , $j = \overline{1, n}$, уравнение его поверхности записывается как $x_{k_j} = \varphi_j(x'_{K_j})$, где $\varphi_j : \mathbb{R}^{k_j-1} \rightarrow \mathbb{R}$ – гладкая функция на множестве $\mathbb{R}^{k_j-1} \setminus \{0\}$, $\varphi_j(0) = 0$, $x_{K_j} = (x'_{K_j}, x_{k_j})$.

Используя замену переменных

$$t'_{K_j} = x'_{K_j}, \quad t_{k_j} = x_{k_j} - \varphi_j(x'_{K_j}),$$

определим оператор $T_{\varphi_j} : \mathbb{R}^{K_j} \rightarrow \mathbb{R}^{K_j}$ как оператор приведённой выше замены переменных, при этом конус C_{K_j} преобразуется в верхнее полупространство $\mathbb{R}_+^{K_j} = \{x \in \mathbb{R}^{K_j} : x_{K_j} = (x'_{K_j}, x_{k_j}), x_{k_j} > 0\}$.

Замечание 2. Разумеется, эта замена переменных нужна только в многомерном случае ($m \geq 2$), в одномерном случае имеется только один конус – луч, граница которого представляет собой точку.

В рассуждениях ниже будем пользоваться обозначением F_m для преобразования Фурье в m -мерном пространстве, следовательно, F_{K_j} обозначает преобразование Фурье в пространстве \mathbb{R}^{K_j} .

Согласно результатам статьи [8] имеют место соотношения $F_{K_j} T_{\varphi_j} = V_{\varphi_j} F_{K_j}$.

Далее введём оператор $T_\varphi : \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^M$ по формуле $T_\varphi = \prod_{j=1}^n T_{\varphi_j}$ и получим оператор $V_\varphi = \prod_{j=1}^n V_{\varphi_j}$, для которого справедливо тождество $F_M T_\varphi = V_\varphi F_M$. Введём также векторы $N = (n_1, \dots, n_n)$, $L = (l_1, \dots, l_n)$, $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, $n_j, l_j \in \mathbb{N}$, $|\delta_j| < 1/2$, $j = \overline{1, n}$.

Теорема 2. Если символ $\hat{A}(\xi)$ допускает волновую факторизацию относительно конуса C с индексом \varkappa таким, что $\varkappa - S = N + \varepsilon$, то общее решение уравнения (3) в образах Фурье имеет следующий вид:

$$\tilde{u}(\xi) = A_{\neq}^{-1}(\xi) V_\varphi^{-1} \left(\sum_{l_1=1}^{n_1} \sum_{l_2=1}^{n_2} \dots \sum_{l_n=1}^{n_n} \tilde{c}_L(\xi'_K) \xi_{k_1}^{l_1-1} \xi_{k_2}^{l_2-1} \dots \xi_{k_n}^{l_n-1} \right), \tag{4}$$

где $c_L(x'_K) \in H^{S_L}(\mathbb{R}^{M-n})$ – произвольные функции,

$$S_L = (s_1 - \varkappa_1 + l_1 - 1/2, \dots, s_n - \varkappa_n + l_n - 1/2), \quad l_j = \overline{1, n_j}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Справедлива априорная оценка

$$\|u\|_S \leq \text{const} \sum_{l_1=1}^{n_1} \sum_{l_2=1}^{n_2} \dots \sum_{l_n=1}^{n_n} \|c_L\|_{S_L}.$$

2. Краевые задачи. В этом пункте рассмотрим некоторые простые постановки краевых задач, связанных с теоремой 2, которая устанавливает множественность возможных решений уравнения (3). Чтобы выделить единственное решение, нужны дополнительные условия. Начнём со случая двумерного конуса. Присутствие в формуле (4) оператора V_φ сильно затрудняет постановку и исследование краевых задач, однако двумерный случай – редкое исключение, где можно обойтись без такого оператора. Это было продемонстрировано в монографии [4], а сравнение двух вариантов представлено в [7].

2.1. Плоский угол и общее решение. Для случая плоского угла возможна только одна ситуация с различной гладкостью по переменным, а именно по одной переменной имеется гладкость порядка s_1 , по другой – s_2 . Наш конус C имеет вид прямого произведения двух лучей, можно считать его первым квадрантом. Предполагается, что символ $\hat{A}(\xi)$ допускает волновую факторизацию относительно C с индексом $\varkappa = (\varkappa_1, \varkappa_2)$ таким, что $\varkappa_j - s_j = n_j + \varepsilon_j$, $n_j \in \mathbb{N}$, $|\varepsilon_j| < 1/2$, $j = 1, 2$. Покажем как в этом случае выглядит формула общего решения (4).

Положим

$$u_-(x) = -(Au)(x), \quad x \in \mathbb{R}^2.$$

В силу равенства (3) $u_-(x) = 0, \quad x \in C$. Запишем уравнение (3) в виде

$$(Au)(x) + u_-(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^2,$$

применим к нему преобразование Фурье:

$$\tilde{A}(\xi)\tilde{u}(\xi) + \tilde{u}_-(\xi) = 0,$$

и после волновой факторизации символа $\tilde{A}(\xi)$ относительно C получим равенство

$$A_{\neq}(\xi)\tilde{u}(\xi) = -A_{=}^{-1}(\xi)\tilde{u}_-(\xi).$$

По лемме 1

$$A_{\neq}(\xi)\tilde{u}(\xi), A_{=}^{-1}(\xi)\tilde{u}_-(\xi) \in \tilde{H}^{S-\varkappa}(\mathbb{R}^2),$$

но более точные включения следующие (см. детали в [4]):

$$A_{\neq}(\xi)\tilde{u}(\xi) \in \tilde{H}^{S-\varkappa}(C), \quad A_{=}^{-1}(\xi)\tilde{u}_-(\xi) \in \tilde{H}^{S-\varkappa}(\mathbb{R}^2 \setminus \bar{C}). \tag{5}$$

Из включений (5) сразу следует, что обратным преобразованием Фурье этих (обобщённых) функций в силу их равенства может быть только функция, сосредоточенная на границе квадранта. Учитывая структуру таких функций [24], можем записать

$$F^{-1}(A_{\neq}(\xi)\tilde{u}(\xi)) = \sum_{k=1}^{r_1} c_k(x_1)\delta^{k-1}(x_2) + \sum_{k=1}^{r_2} d_k(x_2)\delta^{k-1}(x_1)$$

или

$$\tilde{u}(\xi) = A_{\neq}^{-1}(\xi) \left(\sum_{k=1}^{r_1} \tilde{c}_k(\xi_1)\xi_2^{k-1} + \sum_{k=1}^{r_2} \tilde{d}_k(\xi_2)\xi_1^{k-1} \right).$$

Осталось уточнить количество слагаемых в суммах и показатель s_k пространства $H^{s_k}(\mathbb{R})$, в которое входят функции c_k, d_k .

Выделим одно слагаемое, например $A_{\neq}^{-1}(\xi)\tilde{c}_k(\xi_1)\xi_2^{k-1}$, и оценим его:

$$\begin{aligned} \|A_{\neq}^{-1}(\xi)\tilde{c}_k(\xi_1)\xi_2^{k-1}\|_S^2 &= \int_{\mathbb{R}^2} |A_{\neq}^{-1}(\xi)|^2 |\tilde{c}_k(\xi_1)|^2 |\xi_2|^{2(k-1)} (1 + |\xi_1|)^{2s_1} (1 + |\xi_2|)^{2s_2} d\xi \leq \\ &\leq \text{const} \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{c}_k(\xi_1)|^2 (1 + |\xi_1|)^{2(s_1-\varkappa_1)} d\xi_1 \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\xi_2|)^{2(s_2-\varkappa_2+k-1)} d\xi_2. \end{aligned}$$

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\xi_2|)^{2(s_2-\varkappa_2+k-1)} d\xi_2$$

будет сходящимся при условии $2(s_2 - \varkappa_2 + k - 1) < -1$ или $-n_2 - \varepsilon_2 + k < 1/2$. Последнее неравенство справедливо при $k = \overline{1, n_2}$. Таким образом, если $\tilde{c}_k \in \tilde{H}^{-n_1-\varepsilon_1}(\mathbb{R})$, то получаем представление

$$\tilde{u}(\xi) = A_{\neq}^{-1}(\xi) \left(\sum_{k=1}^{n_2} \tilde{c}_k(\xi_1)\xi_2^{k-1} + \sum_{k=1}^{n_1} \tilde{d}_k(\xi_2)\xi_1^{k-1} \right)$$

и оценку для решения

$$\|u\|_S \leq \text{const} \left(\sum_{k=1}^{n_2} [c_k]_{-n_1-\delta_1} + \sum_{k=1}^{n_1} [d_k]_{-n_2-\delta_2} \right),$$

здесь и далее $[\cdot]_s$ обозначает обычную H^s -норму на прямой.

Таким образом, справедлива следующая

Теорема 3. Пусть C – первый квадрант на плоскости и символ $\tilde{A}(\xi)$ допускает волновую факторизацию с индексом $\varkappa = (\varkappa_1, \varkappa_2)$ таким, что $\varkappa_j - s_j = n_j + \varepsilon_j$, $n_j \in \mathbb{N}$, $|\varepsilon_j| < 1/2$, $j = 1, 2$. Тогда общее решение уравнения (3) в пространстве $H^S(C)$, $S = (s_1, s_2)$, имеет вид

$$\tilde{u}(\xi) = A_{\neq}^{-1}(\xi) \left(\sum_{k=1}^{n_2} \tilde{c}_k(\xi_1) \xi_2^{k-1} + \sum_{k=1}^{n_1} \tilde{d}_k(\xi_2) \xi_1^{k-1} \right).$$

Справедлива априорная оценка

$$\|u\|_S \leq \text{const} \left(\sum_{k=1}^{n_2} [c_k]_{-n_1-\delta_1} + \sum_{k=1}^{n_1} [d_k]_{-n_2-\delta_2} \right).$$

2.2. Граничные условия Дирихле и Неймана и интегральные уравнения.

Рассмотрим один частный случай, когда можно ограничиться классическими условиями Дирихле и Неймана для определения произвольных функций, входящих в структуру общего решения.

Пусть $n_1 = 1$, $n_2 = 2$. Согласно теореме 3 общее решение уравнения имеет вид

$$\tilde{u}(\xi) = A_{\neq}^{-1}(\xi) (c_1(\xi_1) + c_2(\xi_1)\xi_2 + d_1(\xi_2))$$

и содержит три произвольные функции c_1 , c_2 , d_1 , которые предстоит однозначно определить для получения единственного решения. На сторонах угла зададим граничные условия следующего вида:

$$u|_{x_2=0} = f(x_1), \quad \left(-i \frac{\partial u}{\partial x_2} \right) \Big|_{x_2=0} = g(x_1), \quad u|_{x_1=0} = h(x_2). \tag{6}$$

В образах Фурье условия (6) имеют вид

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{u}(\xi_1, \xi_2) d\xi_2 = \tilde{f}(\xi_1), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \xi_2 \tilde{u}(\xi_1, \xi_2) d\xi_2 = \tilde{g}(\xi_1), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{u}(\xi_1, \xi_2) d\xi_1 = \tilde{h}(\xi_2).$$

Подставив их в формулу общего решения, получим следующую систему линейных интегральных уравнений относительно трёх неизвестных функций c_1 , c_2 и d_1 :

$$\begin{aligned} a_1(\xi_1)c_1(\xi_1) + b_1(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_{-\infty}^{+\infty} A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{f}(\xi_1), \\ b_1(\xi_1)c_1(\xi_1) + p_1(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_{-\infty}^{+\infty} \xi_2 A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{g}(\xi_1), \\ \int_{-\infty}^{+\infty} A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) c_1(\xi_1) d\xi_1 + \int_{-\infty}^{+\infty} \xi_2 A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) c_2(\xi_1) d\xi_1 + p_2(\xi_2) d_1(\xi_2) &= \tilde{h}(\xi_2), \end{aligned} \tag{7}$$

где введены обозначения

$$a_1(\xi_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d\xi_2, \quad b_1(\xi_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \xi_2 A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d\xi_2,$$

$$p_1(\xi_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \xi_2^2 A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d\xi_2, \quad p_2(\xi_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) d\xi_1.$$

Таким образом, справедлива

Теорема 4. Пусть $s_1 > 1/2$, $s_2 > 3/2$ и символ $\tilde{A}(\xi)$ допускает волновую факторизацию относительно C с индексом \varkappa таким, что $\varkappa_1 - s_1 = 1 + \varepsilon_1$, $|\delta_1| < 1/2$, $\varkappa_2 - s_2 = 2 + \varepsilon_2$, $|\delta_2| < 1/2$. Тогда краевая задача (3), (6) однозначно разрешима в пространстве $H^S(C)$, если система интегральных уравнений (7) имеет единственное решение c_1 , c_2 и d_1 .

2.3. Интегральные и разностные уравнения. Система интегральных уравнений (7), полученная в предыдущем пункте, не проста, и трудно предложить какой-либо приемлемый метод для её решения. Однако если ввести некоторые дополнительные предположения относительно символа $\tilde{A}(\xi)$, то эту систему можно редуцировать к системе разностных уравнений первого порядка. Опишем эту возможность.

Предположим, что множитель $A_{\neq}(\xi_1, \xi_2)$ является положительно однородной функцией разного порядка по переменным ξ_1, ξ_2 , именно, по первой переменной порядка \varkappa_1 , а по второй – \varkappa_2 , при всех $t > 0$, $A_{\neq}(t\xi_1, t\xi_2) = t^{\varkappa_1 + \varkappa_2} A_{\neq}(\xi_1, \xi_2)$.

В этом случае нетрудно убедиться в справедливости следующего свойства однородности.

Лемма 2. Функции a_1, b_1, p_1, p_2 обладают следующим свойством однородности для всех $t > 0$:

$$a_1(t\xi_1) = t^{1-\varkappa_1-\varkappa_2} a_1(\xi_1), \quad b_1(t\xi_1) = t^{2-\varkappa_1-\varkappa_2} b_1(\xi_1),$$

$$p_1(t\xi_1) = t^{3-\varkappa_1-\varkappa_2} p_1(\xi_1), \quad p_2(t\xi_2) = t^{1-\varkappa_1-\varkappa_2} p_2(\xi_2).$$

Систему (7) можно записать в следующем виде:

$$c_1(\xi_1) + r(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_{-\infty}^{+\infty} K(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 = \tilde{F}(\xi_1),$$

$$c_1(\xi_1) + q(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_{-\infty}^{+\infty} L(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 = \tilde{G}(\xi_1),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_1(\xi_1) d\xi_1 + \xi_2 \int_{-\infty}^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_2(\xi_1) d\xi_1 + d_1(\xi_2) = \tilde{H}(\xi_2), \tag{8}$$

где введены обозначения

$$b_1(\xi_1)a_1^{-1}(\xi_1) = r(\xi_1), \quad p_1(\xi_1)b_1^{-1}(\xi_1) = q(\xi_1), \quad a_1^{-1}(\xi_1)A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) \equiv K(\xi_1, \xi_2),$$

$$\xi_2 b_1^{-1}(\xi_1)A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) = L(\xi_1, \xi_2), \quad p_2^{-1}(\xi_2)A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2) = M(\xi_1, \xi_2), \quad \tilde{f}(\xi_1)a_1^{-1}(\xi_1) = \tilde{F}(\xi_1),$$

$$\tilde{g}(\xi_1)b_1^{-1}(\xi_1) = \tilde{G}(\xi_1), \quad \tilde{h}(\xi_2)p_2^{-1}(\xi_2) = \tilde{H}(\xi_2).$$

Лемма 3. Функции r, q положительно однородны первой степени, ядра K, L, M положительно однородны степени -1 .

Доказательство. Для функций r , q утверждение очевидно, и, следовательно, они имеют вид

$$r(t) = \begin{cases} r_1 t, & t > 0, \\ r_2 t, & t < 0, \end{cases} \quad q(t) = \begin{cases} q_1 t, & t > 0, \\ q_2 t, & t < 0, \end{cases}$$

где $r_1, r_2, q_1, q_2 \in \mathbb{C}$.

Рассмотрим, например, ядро $M(\xi_1, \xi_2)$. Проверяем

$$M(t\xi_1, t\xi_2) = p_2^{-1}(t\xi_2)A_{\neq}^{-1}(t\xi_1, t\xi_2) = t^{\kappa_1 + \kappa_2 - 1} p_2(\xi_2) t^{-\kappa_1 - \kappa_2} A_{\neq}^{-1}(\xi_1, \xi_2),$$

что и утверждалось. Лемма доказана.

Далее запишем систему (8) в виде

$$\begin{aligned} c_1(\xi_1) + r(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_0^{+\infty} K(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 + \int_{-\infty}^0 K(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{F}(\xi_1), \\ c_1(\xi_1) + q(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_0^{+\infty} L(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 + \int_{-\infty}^0 L(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{G}(\xi_1), \\ \int_0^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_1(\xi_1) d\xi_1 + \int_{-\infty}^0 M(\xi_1, \xi_2)c_1(\xi_1) d\xi_1 + \xi_2 \int_0^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_2(\xi_1) d\xi_1 + \\ + \xi_2 \int_{-\infty}^0 M(\xi_1, \xi_2)c_2(\xi_1) d\xi_1 + d_1(\xi_2) &= \tilde{H}(\xi_2). \end{aligned}$$

Заменяя в интегралах по отрицательной полуоси переменную интегрирования на переменную с противоположным знаком, получим новую систему с интегралами по положительной полуоси:

$$\begin{aligned} c_1(\xi_1) + r(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_0^{+\infty} K(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} K(\xi_1, -\xi_2) d_1(-\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{F}(\xi_1), \\ c_1(\xi_1) + q(\xi_1)c_2(\xi_1) + \int_0^{+\infty} L(\xi_1, \xi_2) d_1(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} L(\xi_1, -\xi_2) d_1(-\xi_2) d\xi_2 &= \tilde{G}(\xi_1), \\ \int_0^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_1(\xi_1) d\xi_1 + \int_0^{+\infty} M(-\xi_1, \xi_2)c_1(-\xi_1) d\xi_1 + \xi_2 \int_0^{+\infty} M(\xi_1, \xi_2)c_2(\xi_1) d\xi_1 + \\ + \xi_2 \int_0^{+\infty} M(-\xi_1, \xi_2)c_2(-\xi_1) d\xi_1 + d_1(\xi_2) &= \tilde{H}(\xi_2). \end{aligned} \quad (9)$$

Теперь преобразуем эту систему, увеличив число неизвестных и сделав все входящие функции и ядра определёнными только для положительных значений аргументов. Введём следующие обозначения для $\xi_1, \xi_2 > 0$:

$$c_{11}(\xi_1) = c_1(\xi_1), \quad c_{12}(\xi_1) = c_1(-\xi_1), \quad c_{21}(\xi_1) = c_2(\xi_1), \quad c_{22}(\xi_1) = c_2(-\xi_1),$$

$$d_{11}(\xi_2) = d_1(\xi_2), \quad d_{12}(\xi_2) = d_1(-\xi_2), \quad F_1(\xi_1) = \tilde{F}(\xi_1), \quad F_2(\xi_1) = \tilde{F}(-\xi_1),$$

$$G_1(\xi_1) = \tilde{G}(\xi_1), \quad G_2(\xi_1) = \tilde{G}(-\xi_1), \quad H_1(\xi_2) = \tilde{H}(\xi_2), \quad H_2(\xi_2) = \tilde{H}(-\xi_2).$$

По ядрам K , L , M определим новые ядра для положительных значений аргументов:

$$K_{11}(\xi_1, \xi_2) = K(\xi_1, \xi_2), \quad K_{12}(\xi_1, \xi_2) = K(\xi_1, -\xi_2),$$

$$K_{21}(\xi_1, \xi_2) = K(-\xi_1, \xi_2), \quad K_{22}(\xi_1, \xi_2) = K(-\xi_1, -\xi_2),$$

аналогично определяются $L_{ij}(\xi_1, \xi_2)$, $M_{ij}(\xi_1, \xi_2)$, $i, j = 1, 2$.

Система (9) примет вид 6×6 -системы линейных интегральных уравнений на положительной полуоси

$$c_{11}(\xi_1) + r_1 \xi_1 c_{21}(\xi_1) + \int_0^{+\infty} K_{11}(\xi_1, \xi_2) d_{11}(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} K_{12}(\xi_1, \xi_2) d_{12}(\xi_2) d\xi_2 = F_1(\xi_1),$$

$$c_{11}(\xi_1) + q_1 \xi_1 c_{21}(\xi_1) + \int_0^{+\infty} L_{11}(\xi_1, \xi_2) d_{11}(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} L_{12}(\xi_1, \xi_2) d_{12}(\xi_2) d\xi_2 = G_1(\xi_1),$$

$$\int_0^{+\infty} M_{11}(\xi_1, \xi_2) c_{11}(\xi_1) d\xi_1 + \int_0^{+\infty} M_{21}(\xi_1, \xi_2) c_{12}(\xi_1) d\xi_1 + \xi_2 \int_0^{+\infty} M_{11}(\xi_1, \xi_2) c_{21}(\xi_1) d\xi_1 +$$

$$+ \xi_2 \int_0^{+\infty} M_{21}(\xi_1, \xi_2) c_{22}(\xi_1) d\xi_1 + d_{11}(\xi_2) = H_1(\xi_2),$$

$$c_{12}(\xi_1) + r_2 \xi_1 c_{22}(\xi_1) + \int_0^{+\infty} K_{21}(\xi_1, \xi_2) d_{11}(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} K_{22}(\xi_1, \xi_2) d_{12}(\xi_2) d\xi_2 = F_2(\xi_1),$$

$$c_{12}(\xi_1) + q_2 \xi_1 c_{22}(\xi_1) + \int_0^{+\infty} L_{21}(\xi_1, \xi_2) d_{11}(\xi_2) d\xi_2 + \int_0^{+\infty} L_{22}(\xi_1, \xi_2) d_{12}(\xi_2) d\xi_2 = G_2(\xi_1),$$

$$\int_0^{+\infty} M_{12}(\xi_1, \xi_2) c_{11}(\xi_1) d\xi_1 + \int_0^{+\infty} M_{22}(\xi_1, \xi_2) c_{12}(\xi_1) d\xi_1 + \xi_2 \int_0^{+\infty} M_{12}(\xi_1, \xi_2) c_{21}(\xi_1) d\xi_1 +$$

$$+ \xi_2 \int_0^{+\infty} M_{22}(\xi_1, \xi_2) c_{22}(\xi_1) d\xi_1 + d_{12}(\xi_2) = H_2(\xi_2).$$

К этой системе можно применить преобразование Меллина [25]

$$\hat{f}(\lambda) = \int_0^{+\infty} f(t) t^{\lambda-1} dt, \quad \lambda = s + i\sigma,$$

в результате чего получим с учётом свойства преобразования Меллина

$$\widehat{tf(t)}(\lambda) = \hat{f}(\lambda + 1)$$

следующую систему разностных уравнений первого порядка:

$$\hat{c}_{11}(\lambda) + r_1 \hat{c}_{21}(\lambda + 1) + \hat{K}_{11}(\lambda) \hat{d}_{11}(\lambda) + \hat{K}_{12}(\lambda) \hat{d}_{12}(\lambda) = \hat{F}_1(\lambda),$$

$$\hat{c}_{12}(\lambda) + r_2 \hat{c}_{22}(\lambda + 1) + \hat{K}_{21}(\lambda) \hat{d}_{11}(\lambda) + \hat{K}_{22}(\lambda) \hat{d}_{12}(\lambda) = \hat{F}_2(\lambda),$$

$$\hat{c}_{11}(\lambda) + q_1 \hat{c}_{21}(\lambda + 1) + \hat{L}_{11}(\lambda) \hat{d}_{11}(\lambda) + \hat{L}_{12}(\lambda) \hat{d}_{12}(\lambda) = \hat{G}_1(\lambda),$$

$$\hat{c}_{12}(\lambda) + q_2 \hat{c}_{22}(\lambda + 1) + \hat{L}_{21}(\lambda) \hat{d}_{11}(\lambda) + \hat{L}_{22}(\lambda) \hat{d}_{12}(\lambda) = \hat{G}_2(\lambda),$$

$$\hat{M}_{11}(\lambda) \hat{c}_{11}(\lambda) + \hat{M}_{21}(\lambda) \hat{c}_{12}(\lambda) + \hat{M}_{11}(\lambda + 1) \hat{c}_{21}(\lambda + 1) + \hat{M}_{21}(\lambda + 1) \hat{c}_{22}(\lambda + 1) + \hat{d}_{11}(\lambda) = \hat{H}_1(\lambda),$$

$$\hat{M}_{12}(\lambda) \hat{c}_{11}(\lambda) + \hat{M}_{22}(\lambda) \hat{c}_{12}(\lambda) + \hat{M}_{12}(\lambda + 1) \hat{c}_{21}(\lambda + 1) + \hat{M}_{22}(\lambda + 1) \hat{c}_{22}(\lambda + 1) + \hat{d}_{12}(\lambda) = \hat{H}_2(\lambda), \quad (10)$$

где под $\hat{K}_{ij}(\lambda)$, $\hat{L}_{ij}(\lambda)$ понимается преобразование Меллина функций $K_{ij}(t, 1)$, $L_{ij}(t, 1)$, а под $\hat{M}_{ij}(\lambda)$ – преобразование Меллина функций $M_{ij}(1, t)$, $i, j = 1, 2$.

Таким образом, справедлива

Теорема 5. Если функция обладает свойством обобщённой положительной однородности, т.е.

$$A_{\neq}(t\xi_1, t\xi_2) = t^{\alpha_1 + \alpha_2} A_{\neq}(\xi_1, \xi_2)$$

при всех $t > 0$, то система интегральных уравнений (7) может быть сведена к 6×6 -системе разностных уравнений первого порядка (10).

Заключение. Описан простейший вариант краевой задачи в пространстве Соболева–Слободецкого с различной гладкостью по переменным. К сожалению, формула общего решения в многомерном случае слишком громоздка, чтобы записать и исследовать общую краевую задачу, однако в ряде случаев можно получить содержательные результаты. Авторы предполагают продолжать работу в этом направлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эскин Г.И. Краевые задачи для эллиптических псевдодифференциальных уравнений. М., 1973.
2. Ремпель Ш., Шульце Б.-В. Теория индекса краевых задач. М., 1986.
3. Назаров С.А., Пламеневский Б.А. Краевые задачи в областях с кусочно гладкой границей. М., 1991.
4. Vasil'ev V.B. Wave Factorization of Elliptic Symbols: Theory and Applications. Introduction to the Theory of Boundary Value Problems in Non-smooth Domains. Dordrecht; Boston; London, 2000.
5. Васильев В.Б. Мультипликаторы интегралов Фурье, псевдодифференциальные уравнения, волновая факторизация, краевые задачи. М., 2010.
6. Vasilyev V.B. On certain elliptic problems for pseudo differential equations in a polyhedral cone // Adv. Dyn. Syst. Appl. 2014. V. 9. № 2. P. 227–237.
7. Vasilyev V.B. Pseudo-differential equations and conical potentials: 2-dimensional case // Opusc. Math. 2019. V. 39. № 1. P. 109–124.
8. Vasilyev V.B. Pseudo-differential equations, wave factorization, and related problems // Math. Meth. Appl. Sci. 2018. V. 41. P. 9252–9263.
9. Васильев В.Б. Псевдодифференциальные уравнения в конусах с точками сопряжения на границе // Дифференц. уравнения. 2015. Т. 51. № 9. С. 1123–1135.
10. Vasilyev V.B. On some distributions associated to boundary value problems // Complex Var. Ell. Equat. 2019. V. 64. № 5. P. 888–898.
11. Волевич Л.Р., Гундикин С.Г. Обобщенные функции и уравнения в свертках. М., 1994.
12. Трибель Х. Теория интерполяции, функциональные пространства, дифференциальные операторы. М., 1980.
13. Трибель Х. Теория функциональных пространств. М., 1986.
14. Nagel A., Ricci F., Stein E.M., Wainger S. Algebras of singular integral operators with kernels controlled by multiple norms // Memoirs of Amer. Math. Soc. 2018. V. 256. № 1230.
15. Vasilyev V., Polunin V., Shmal I. On some solvability theorems for pseudo-differential equations // arXiv:2302.10054 [math.AP].

16. *Vasilyev V.B.* On the Dirichlet and Neumann problems in multi-dimensional cone // *Math. Bohem.* 2014. V. 139, № 2. P. 333–340.
17. *Vasilyev V.B.* Pseudo-differential operators on manifolds with a singular boundary // *Modern Problems in Applied Analysis* / Eds. P. Drygas, S. Rogosin. Cham, 2018. P. 169–179.
18. *Vasilyev V.B.* Asymptotical analysis of singularities for pseudo differential equations in canonical non-smooth domains // *Integral Methods in Science and Engineering. Computational and Analytic Aspects* / Eds. C. Constanda, P.J. Harris. Boston, 2011. P. 379–390.
19. *Vasilyev V.B.* On the asymptotic expansion of certain plane singular integral operators // *Bound. Value Probl.* 2017. V. 116. P. 1–13.
20. *Васильев В.Б.* Потенциалы для эллиптических краевых задач в конусах // *Сиб. электрон. мат. изв.* 2016. Т. 13. С. 1129–1149.
21. *Васильев В.Б.* Псевдодифференциальные уравнения на многообразиях со сложными особенностями на границе // *Сиб. журн. чистой и прикл. математики.* 2016. № 3. С. 3–14.
22. *Васильев В.Б.* Модельные эллиптические краевые задачи для псевдодифференциальных уравнений в канонических негладких областях // *Тр. сем. им. И.Г. Петровского.* 2016. Т. 31. С. 22–37.
23. *Васильев В.Б.* Псевдодифференциальные уравнения, сингулярные интегралы и распределения // *Прикл. математика и мат. физика.* 2015. Т. 1. № 1. С. 3–16.
24. *Гельфанд И.М., Шиллов Г.Е.* Обобщенные функции и действия над ними. М., 1959.
25. *Титчмарш Е.* Введение в теорию интегралов Фурье. М.; Л., 1948.

Белгородский государственный
национальный исследовательский университет

Поступила в редакцию 13.03.2023 г.
После доработки 23.03.2023 г.
Принята к публикации 18.04.2023 г.