

УДК 576.316:597.523

СХОДСТВО КАРИОТИПОВ ТРЁХ ВИДОВ КЛЮВОРЫЛОВ РОДА *MORMYRUS* (MORMYRIDAE) ИЗ ПРИТОКОВ БЕЛОГО НИЛА И РЕКИ ОМО В ЭФИОПИИ[#]

© 2021 г. С. А. Симановский¹, *, Д. А. Медведев¹, Фекаду Тефера², А. С. Голубцов¹

¹Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН Москва, Россия

²Национальный центр рыболовства и биологических водных ресурсов Эфиопского института
сельскохозяйственных исследований, Собата, Эфиопия

*E-mail: sergey.a.simanovsky@gmail.com

Поступила в редакцию 03.08.2020 г.

После доработки 11.08.2020 г.

Принята к публикации 11.08.2020 г.

У трёх видов клюворылов рода *Mormyrus* (Mormyridae, Osteoglossiformes), населяющих бассейны Белого Нила и реки Омо в Юго-Восточной Эфиопии, изучены наборы митотических хромосом. Структура кариотипа у *M. caschive*, *M. hasselquistii* и *M. kannume* оказалась схожей ($2n = 50$, $FN = 84$). *Mormyrus* является уже 14-м родом в семействе, чьи представители изучены кариологически. Уникальной особенностью этого рода, вероятно, является наименьшее для семейства число одноплечих хромосом в кариотипе.

Ключевые слова: хромосомы, эволюция кариотипа, *Mormyrus caschive*, *Mormyrus hasselquistii*, *Mormyrus kannume*.

DOI: 10.31857/S0042875221020223

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.