

УДК 597.08

**ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
*TURCINOEMACHEILUS SAADII* (NEMACHEILIDAE)  
В СВЯЗИ С ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ РОДА<sup>#</sup>**

© 2022 г. Х. Моусави-Сабет<sup>1, 2, \*</sup>, Х. Азими<sup>2</sup>, С. Игдери<sup>3</sup>, С. Ватандоуст<sup>4</sup>, Е. Д. Васильева<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Гилянский университет, Гилян, Иран

<sup>2</sup>Центр исследования бассейна Каспийского моря Гилянского университета, Решт, Иран

<sup>3</sup>Тегеранский университет, Карадж, Иран

<sup>4</sup>Исламский университет Азада, Мазандаран, Иран

<sup>5</sup>Зоологический музей Московского государственного университета, Москва, Россия

\*E-mail: mousavi-sabet@guilan.ac.ir

Поступила в редакцию 08.12.2021 г.

После доработки 15.02.2022 г.

Принята к публикации 18.02.2022 г.

Представлены подробные остеологические характеристики *Turcinoemacheilus saadii* в связи с попыткой оценить их значение для группировки разных родов. В целом сравнительный остеологический анализ *T. saadii* и других изученных ранее видов рода *Turcinoemacheilus*, близкородственного рода *Paraschistura*, а также родов *Paracobitis* и *Охуноемачеилус* показывает отсутствие диагностических признаков для общепринятых в настоящее время родов или каких-либо других групп видов. Тем не менее некоторые остеологические признаки имеют диагностическое значение на видовом уровне, прежде всего, количество базибранхиальных и гипуральных костей, позвонков, птеригофоров, неветвистых и ветвистых лучей плавников, а также форма и положение некоторых костей и их соединений.

*Ключевые слова:* гольцы, остеология, филогенетическое значение, диагностическое значение, *Turcinoemacheilus saadii*, Иран.

DOI: 10.31857/S0042875222050149

<sup>#</sup> Полностью статья опубликована в английской версии журнала.