

УДК 597.08

## О ДВУХ ВИДАХ ДЛИННОУСЫХ АСТРОНЕСТОВ ГРУППЫ “*ASTRONESTHES CYANEUS*” (STOMIIDAE) ИЗ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА<sup>#</sup>

© 2022 г. Р. Раджив<sup>1</sup>, \*, М. П. Раджешкумар<sup>1</sup>, К. М. Мира<sup>2</sup>, К. К. Карати<sup>1</sup>, Н. Сараванане<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Центр морских живых ресурсов и экологии Министерства наук о земле, Кочи, Индия

<sup>2</sup>Университет рыболовства и океанологических исследований штата Керала, Кочи, Индия

\*E-mail: rajeevrajakrishnan@gmail.com

Поступила в редакцию 16.06.2021 г.

После доработки 28.03.2022 г.

Принята к публикации 29.03.2022 г.

Сообщается о поимке *Astronesthes* cf. *indopacificus* и *A. formosana* соответственно из Аравийского моря и центральной части Индийского океана. Первый вид предварительно идентифицирован как *A. cf. indopacificus*, он отличается от *A. formosana* главным образом меньшим количеством фотофоров и позвонков, а также формой светящегося пятна на предкрышке. Для Индийского океана о находке *A. formosana* сообщается впервые. У исследуемых видов наиболее варьирующими диагностическими признаками являются длина усика относительно длины головы и обилие светящихся тканей на теле.

*Ключевые слова:* мезопелагиаль, северная часть Индийского океана, *Astronesthes (cyaneus)*, *Astronesthes formosana*, *Astronesthes indopacificus*, Stomiidae.

**DOI:** 10.31857/S0042875222050198

---

<sup>#</sup> Полностью статья опубликована в английской версии журнала.