

УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

УДК 519.634

СУЩЕСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ЛАМБА В СЛУЧАЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА

© 2023 г. А. В. Кравцов^{1,*}¹ 119991 Москва, Ленинские горы, МГУ, физ. ф-т, Россия

*e-mail: avkravtsov@rambler.ru

Поступила в редакцию 14.04.2023 г.

Переработанный вариант 14.04.2023 г.

Принята к публикации 26.06.2023 г.

Рассматривается начально-краевая задача Ламба для упругого полупространства в случае, когда коэффициент Пуассона принимает предельное значение $1/2$. Доказывается существование классического решения для осевой симметрии в виде повторного несобственного интеграла. Библ. 6.

Ключевые слова: упругая среда, уравнения Ламэ, коэффициент Пуассона, интеграл Фурье–Бесселя, интеграл Меллина, оценки интегралов.

DOI: 10.31857/S0044466923100083, EDN: LIPUJQ

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ФОРМАЛЬНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ

В упругой среде, занимающей полупространство, малые относительные перемещения описываются уравнениями Ламэ

$$(\lambda + \mu) \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u} + \mu \Delta \mathbf{u} = \rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2},$$

где $\mathbf{u}$ — вектор перемещений, λ , μ и ρ_0 соответственно параметры Ламэ и плотность упругой среды.

Пусть к свободной поверхности S упругой среды приложена нагрузка $\mathbf{n}\tilde{p}$, где $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней нормали к S , $\tilde{p}$ — заданная функция точки поверхности и времени. В соответствии с [1], граничные условия на свободной поверхности зададим в виде

$$2\mu \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial n} + \lambda \mathbf{n} \operatorname{div} \mathbf{u} + \rho_0 g(\mathbf{u}, \mathbf{n}) + \mu[\mathbf{n}, \operatorname{rot} \mathbf{u}] = \mathbf{n}\tilde{p},$$

где g — ускорение свободного падения (вектор $\mathbf{n}$ противоположен вектору силы тяжести).

Параметры Ламэ выражаются через коэффициент Пуассона ν и модуль Юнга E следующим образом:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Далее будем считать, что $\nu \rightarrow \frac{1}{2} - 0$, а $E \rightarrow +0$, но так, что отношение $\frac{E}{1-2\nu} \rightarrow k > 0$. Поэтому

$\lambda \rightarrow \frac{k}{3}$, $\mu \rightarrow +0$, что означает отсутствие в упругой среде волн сдвига. Для отличного от нуля параметра Ламэ мы сохраним прежнее обозначение λ . Тогда уравнения для перемещений и граничные условия на свободной поверхности примут вид

$$\lambda \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u} = \rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}, \quad \lambda \operatorname{div} \mathbf{u} + \rho_0 g(\mathbf{u}, \mathbf{n}) = \tilde{p}.$$

Представим вектор перемещений в виде $\mathbf{u} = \text{grad } \varphi$. Введем цилиндрическую систему координат r, θ, z , для которой поверхность S совпадает с плоскостью $z = 0$ и орт оси z сонаправлен с вектором $\mathbf{n}$.

Пусть функция $\tilde{p}$ имеет вид $\tilde{p}(r, t) = p_0 f(r) e^{-\alpha t} \sin \omega t$, где $f(r)$ — заданная непрерывная функция, допускающая разложение в интеграл Фурье—Бесселя, а p_0, α, ω — заданные положительные постоянные величины. Заметим, что формальное интегральное представление решения начально-краевой задачи Лэмба в случае предельного значения коэффициента Пуассона представлено в [2]. Там же получена асимптотическая оценка решения при больших значениях полярного радиуса. Задача об установившихся колебаниях упругого полупространства в случае предельного значения коэффициента Пуассона рассматривалась в [3], где было доказано существование классического решения при $r > 0, z \leq 0$ и получены асимптотические формулы для компонент вектора перемещений при достаточно больших r . Формальное интегральное представление решения задачи Лэмба в случае распределенной гармонической нагрузки для произвольного ν из интервала $(0, 1/2)$ представлено в [4], где было проведено сравнение аналитического и численного решений. В [5] начально-краевая задача Лэмба для полупространства решалась методом конечных элементов.

Для функции φ в безразмерных переменных, для которых сохранены прежние обозначения, получим задачу (см. [2])

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = \Delta \varphi, \quad (r, z, t) \in \Omega: \quad r > 0, \quad z < 0, \quad t > 0, \quad (1)$$

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right|_{z=0} = \frac{p_0}{\rho_0 a^2} f(r) e^{-\gamma t} \sin t, \quad r > 0, \quad t \geq 0,$$

$$\varphi \rightarrow 0, \quad \sqrt{r^2 + z^2} \rightarrow +\infty, \quad t \geq 0, \quad |\varphi| \leq C, \quad (r, z, t) \in \Omega': \quad r > 0, \quad z \leq 0, \quad t \geq 0, \quad (2)$$

$$\varphi|_{t=0} = \left. \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, \quad r > 0, \quad z \leq 0, \quad a = \sqrt{\frac{\lambda}{\rho_0}}, \quad \beta = \frac{g}{\omega a}, \quad \gamma = \frac{\alpha}{\omega}.$$

Кроме того, считаем, что функция $f(r)$ имеет вид

$$f(r) = \frac{l^3}{(r^2 + l^2)^{3/2}}, \quad l > 0.$$

Формальное, не зависящее от θ , классическое решение задачи (1), (2) в виде интеграла Фурье—Бесселя следующее (см. [2]):

$$\varphi(r, z, t) = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \Phi(x, z, t) x dx, \quad (r, z, t) \in \Omega', \quad (3)$$

где $J_0(u)$ — функция Бесселя нулевого порядка, а $\Phi(x, z, t)$ — образ Фурье—Бесселя функции $\varphi(r, z, t)$, который при $x > 0$ имеет вид интеграла Меллина

$$\Phi(x, z, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \frac{A e^{pt - lx + z\sqrt{p^2 + x^2}} dp}{[(p + \gamma)^2 + 1] (p^2 + \beta\sqrt{p^2 + x^2})}, \quad A = \frac{p_0 l^2}{\rho_0 a^2}. \quad (4)$$

Здесь b — любое положительное число, $p = \xi + i\eta$, а $\sqrt{p^2 + x^2}$ означает аналитическую в области $p \notin (-i\infty, -ix] \cup [ix, +i\infty)$ функцию такую, что $\sqrt{\xi^2 + x^2} > 0 \quad \forall x > 0$.

В [2] было показано, что для интеграла Меллина имеет место представление

$$\Phi(x, z, t) = 2\pi i \sum_{n=1}^4 \text{res}[F(p, x, z, t), p_n] - I_{1l}(x, z, t) - I_{1r}(x, z, t) - I_{2l}(x, z, t) - I_{2r}(x, z, t), \quad (5)$$

где $\text{res}[F(p, x, z, t), p_n]$ — вычеты в полюсах p_n его подынтегральной функции $F(p, x, z, t)$ (множитель $\frac{1}{2\pi i}$ включается в подынтегральную функцию), а $I_{1l}(x, z, t), \dots, I_{2r}(x, z, t)$ — интегралы от $F(p, x, z, t)$ по берегам разрезов $\Gamma_1: [ix, +i\infty), \Gamma_2: (-i\infty, -ix]$:

$$p_k(x) = \pm i\sigma(x), \quad \sigma(x) = \sqrt{\sqrt{\frac{\beta^4}{4} + \beta^2 x^2} - \frac{\beta^2}{2}}, \quad k = 1, 2, \quad p_m = -\gamma \pm i, \quad m = 3, 4,$$

$$\text{res}[F(p, x, z, t), p_k] = \mp \frac{B e^{\pm i\sigma(x)t - lx + z\sqrt{x^2 - \sigma^2(x)}} \sqrt{x^2 - \sigma^2(x)}}{\sigma(x) \{ [\pm i\sigma(x) + \gamma]^2 + 1 \} (2\sqrt{x^2 - \sigma^2(x)} + \beta)}, \quad B = \frac{A}{2\pi},$$

(верхний знак соответствует $k = 1$, нижний $k = 2$),

$$\text{res}[F(p, x, z, t), p_m] = \mp \frac{B e^{(-\gamma \pm i)t - lx + zy(p_m, x)}}{2 [(-\gamma \pm i)^2 + \beta y(p_m, x)]}, \quad y(p_m, x) = \left[(x^2 + \gamma^2 - 1)^2 + 4\gamma^2 \right]^{1/4} e^{i\psi_m(x)},$$

$$\psi_m(x) = \begin{cases} \mp \frac{\pi}{2} \pm \frac{1}{2} \left(\arctg \frac{\gamma}{1-x} + \arctg \frac{\gamma}{1+x} \right), & 0 < x < 1, \\ \mp \frac{\pi}{4} \pm \frac{1}{2} \arctg \frac{\gamma}{2}, & x = 1, \\ \pm \frac{1}{2} \left(\arctg \frac{\gamma}{x+1} - \arctg \frac{\gamma}{x-1} \right), & x > 1 \end{cases}$$

(верхний знак соответствует $m = 3$, нижний $m = 4$),

$$\begin{aligned} I_{1l}(x, z, t) &= - \int_x^{+\infty} \frac{B e^{i\eta t - lx - iz\sqrt{\eta^2 - x^2}} d\eta}{[(i\eta + \gamma)^2 + 1] (\eta^2 + i\beta\sqrt{\eta^2 - x^2})}, \\ I_{1r}(x, z, t) &= - \int_x^{+\infty} \frac{B e^{i\eta t - lx + iz\sqrt{\eta^2 - x^2}} d\eta}{[(i\eta + \gamma)^2 + 1] (-\eta^2 + i\beta\sqrt{\eta^2 - x^2})}, \\ I_{2l}(x, z, t) &= \int_x^{+\infty} \frac{B e^{-i\eta t - lx + iz\sqrt{\eta^2 - x^2}} d\eta}{[(-i\eta + \gamma)^2 + 1] (-\eta^2 + i\beta\sqrt{\eta^2 - x^2})}, \\ I_{2r}(x, z, t) &= \int_x^{+\infty} \frac{B e^{-i\eta t - lx - iz\sqrt{\eta^2 - x^2}} d\eta}{[(-i\eta + \gamma)^2 + 1] (\eta^2 + i\beta\sqrt{\eta^2 - x^2})} \end{aligned}$$

(индексы $1l, 1r$ соответствуют левому и правому берегам разреза Γ_1 , а индексы $2l, 2r$ — левому и правому берегам разреза Γ_2).

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Докажем, что функция $\Phi(r, z, t)$ является решением задачи (1), (2). Сначала убедимся, что эта функция удовлетворяет уравнению (1) в области Ω .

В [2] было показано, что функция $x\Phi(x, z, t)$ под знаком интеграла в (3) непрерывна на множестве G' : $x \geq 0, z \leq 0, t \geq 0$. Докажем, что данная функция имеет на G' непрерывные частные производные по z и t до второго порядка включительно.

Рассмотрим интеграл $I_{1l}(x, z, t)$. Для любого $x > 0$ сделаем замену $s = \eta - x$. Получим

$$I_{1l}(x, z, t) = - \int_0^{+\infty} \frac{B e^{i(s+x)t - lx - iz\sqrt{s(s+2x)}} ds}{\{ [i(s+x) + \gamma]^2 + 1 \} [i\beta\sqrt{s(s+2x)} - (s+x)^2]} := \int_0^{+\infty} f_0(s, x, z, t) ds.$$

На множестве H : $s \geq 0$, $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$ функция $f_0(s, x, z, t)$ имеет непрерывные частные производные

$$\frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} = (-i)^k [s(s+2x)]^{k/2} f_0, \quad \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} = [i(s+x)]^k f_0, \quad k = 1, 2.$$

Рассмотрим интегралы

$$I_z^k(x, z, t) := \int_0^{+\infty} \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} ds, \quad I_t^k(x, z, t) := \int_0^{+\infty} \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} ds, \quad k = 1, 2.$$

При фиксированных x, z, t , принадлежащих множеству G : $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$, они сходятся абсолютно по признаку сравнения:

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} \right| s^2 = \lim_{s \rightarrow +\infty} \left| \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} \right| s^2 = 0.$$

Докажем, что эти интегралы сходятся равномерно на G . Представим I_z^k в виде

$$I_z^k = \int_0^1 + \int_1^{s_0} + \int_{s_0}^{+\infty} := I_{1z}^k + I_{2z}^k + I_{3z}^k,$$

где s_0 — любое число, большее $\sqrt{\gamma^2 + 1}$. Интегралы I_{1z}^k, I_{2z}^k — собственные. Для подынтегральных функций интегралов I_{3z}^k при всех $s \geq s_0$, $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$ имеем

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} \right| < \frac{[s(s+2x)]^{k/2} B e^{-lx}}{[s^2 - 1 - \gamma^2](s+x)^2} < \frac{B e^{-lx} s^{-1+k/2}}{s^2 - 1 - \gamma^2} \frac{s+2x}{s+x} < \frac{2B e^{-lx} s^{-1+k/2}}{s^2 - 1 - \gamma^2} < \frac{2Bs^{-1+k/2}}{s^2 - 1 - \gamma^2}. \quad (6)$$

Поэтому I_{3z}^k сходятся равномерно на G по признаку Вейерштрасса. Тогда интеграл $I_{1t}(x, z, t)$ имеет на G непрерывную частную производную по z до второго порядка включительно, причем

$$\frac{\partial^k}{\partial z^k} \int_0^{+\infty} f_0(s, x, z, t) ds = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k}(s, x, z, t) ds, \quad k = 1, 2. \quad (7)$$

Представим I_t^k в виде

$$I_t^k = \int_0^1 + \int_1^{s_0} + \int_{s_0}^{+\infty} := I_{1t}^k + I_{2t}^k + I_{3t}^k.$$

Интегралы I_{1t}^k, I_{2t}^k — собственные. Для подынтегральных функций интегралов I_{3t}^k при всех $s \geq s_0$, $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$ имеем

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} \right| < \frac{B e^{-lx}}{[s^2 - 1 - \gamma^2](s+x)^{2-k}} < \frac{B e^{-lx}}{[s^2 - 1 - \gamma^2] s^{2-k}} < \frac{B}{[s^2 - 1 - \gamma^2] s^{2-k}}. \quad (8)$$

Поэтому I_{3t}^k сходятся равномерно на G по признаку Вейерштрасса. Тогда интеграл $I_{1t}(x, z, t)$ имеет на G непрерывную частную производную по t до второго порядка включительно, причем

$$\frac{\partial^k}{\partial t^k} \int_0^{+\infty} f_0(s, x, z, t) ds = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k}(s, x, z, t) ds, \quad k = 1, 2. \quad (9)$$

Точно так же доказывается, что и остальные интегралы I_{1r}, I_{2l}, I_{2r} имеют на G непрерывные частные производные по z, t до второго порядка включительно и дифференцирование можно проводить под знаками интегралов.

Непосредственным дифференцированием убеждаемся, что функция $f_0(s, x, z, t)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 f_0}{\partial z^2} - x^2 f_0 = \frac{\partial^2 f_0}{\partial t^2}, \quad (s, x, z, t) \in H.$$

Откуда, в силу (7), (9), следует, что и интеграл $I_{1l}(x, z, t)$ удовлетворяет этому уравнению

$$\frac{\partial^2 I_{1l}}{\partial z^2} - x^2 I_{1l} = \frac{\partial^2 I_{1l}}{\partial t^2}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Аналогичным образом доказывается, что интегралы I_{1r}, I_{2l}, I_{2r} удовлетворяют на G тому же уравнению.

Функции $F_n(x, z, t) := \text{res}[F(p, x, z, t), p_n]$, $n = 1, 2, 3, 4$, имеют на G непрерывные частные производные по z и t до второго порядка включительно. Поэтому, в силу доказанного выше, этими свойствами обладает и $\Phi(x, z, t)$. Кроме того, имеют место равенства

$$\frac{\partial^2 F_n}{\partial z^2} - x^2 F_n = \frac{\partial^2 F_n}{\partial t^2}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Откуда, также в силу доказанного выше, следует, что

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - x^2 \Phi = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}, \quad (x, z, t) \in G. \quad (10)$$

Получим оценки частных производных по z, t первого и второго порядков от всех функций в правой части (5), умноженных на x . Рассмотрим, например, произведения $x \frac{\partial^k I_{1l}}{\partial z^k}$, которые, в силу (7), равны $x I_z^k$, $k = 1, 2$.

Пусть $0 < s \leq 1$, $0 < x \leq \delta$, $z \leq 0$, $t \geq 0$, а δ — любое число из интервала $(0, \sqrt{\gamma^2 + 1} - 1)$. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} \right| < \frac{B(2\delta + 1)^{k/2}}{\gamma^2 + 1 - (\delta + 1)^2} \frac{e^{-lx}}{\beta \sqrt{2sx}}.$$

Поэтому, в силу сходимости интеграла $\int_0^1 \frac{ds}{\sqrt{s}}$, будем иметь

$$x |I_{1z}^k| \leq C_1 \sqrt{x} e^{-lx}.$$

Пусть $0 \leq s \leq 1$, $x > \delta$, $z \leq 0$, $t \geq 0$. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} \right| < \frac{[s(s + 2x)]^{k/2}}{2\gamma(s + x)^3} B e^{-lx} < \frac{B e^{-lx}}{2\gamma \delta^{3-k/2}} \left(\frac{s + 2x}{s + x} \right)^{k/2} \leq \frac{2^{-1+k/2}}{\gamma \delta^{3-k/2}} B e^{-lx}, \quad x |I_{1z}^k| < C_2 x e^{-lx}.$$

Следовательно,

$$x |I_{1z}^k| < C_3 (\sqrt{x} + x) e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Пусть $1 \leq s \leq s_0$, $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial z^k} \right| < \frac{[s(s + 2x)]^{k/2}}{2\gamma(s + x)^3} B e^{-lx} < \frac{B e^{-lx}}{2\gamma s^{3-k}} \left(\frac{s + 2x}{s + x} \right)^{k/2} \leq 2^{-1+k/2} \frac{B e^{-lx}}{\gamma}.$$

Поэтому

$$x |I_{2z}^k| < C_4 x e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Из (6) следует, что

$$x |I_{3z}^k| < C_5 x e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Из указанных выше оценок и равенства (7) получаем

$$x \left| \frac{\partial^k I_{lt}}{\partial z^k} \right| < C_6 (\sqrt{x} + x) e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G, \quad k = 1, 2.$$

Пусть $0 < s \leq 1$, $0 < x \leq \delta$, $z \leq 0$, $t \geq 0$, где δ имеет тот же смысл, что и ранее. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} \right| < \frac{B(\delta + 1)^k}{\gamma^2 + 1 - (\delta + 1)^2} \frac{e^{-lx}}{\beta \sqrt{2sx}}, \quad x |I_{lt}^k| \leq C_7 \sqrt{x} e^{-lx}.$$

Пусть $0 \leq s \leq 1$, $x > \delta$, $z \leq 0$, $t \geq 0$. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} \right| < \frac{B e^{-lx}}{2\gamma(s + x)^{3-k}} \leq \frac{B e^{-lx}}{2\gamma \delta^{3-k}}, \quad x |I_{lt}^k| < C_8 x e^{-lx}.$$

Следовательно,

$$x |I_{lt}^k| < C_9 (\sqrt{x} + x) e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Пусть $1 \leq s \leq s_0$, $x > 0$, $z \leq 0$, $t \geq 0$. Тогда

$$\left| \frac{\partial^k f_0}{\partial t^k} \right| < \frac{B e^{-lx}}{2\gamma(s + x)^{3-k}} < \frac{B e^{-lx}}{2\gamma}.$$

Поэтому

$$x |I_{2t}^k| < C_{10} x e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Из (8) следует, что

$$x |I_{3t}^k| < C_{11} x e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G.$$

Из указанных выше оценок и равенства (9) получаем

$$x \left| \frac{\partial^k I_{lt}}{\partial t^k} \right| < C_{12} (\sqrt{x} + x) e^{-lx}, \quad (x, z, t) \in G, \quad k = 1, 2.$$

В [2] были получены оценки

$$|F_k| \leq C_{13} e^{-lx}, \quad k = 1, 2, \quad x |F_m| \leq C_{14} \sqrt{x} e^{-lx}, \quad m = 3, 4, \quad (x, z, t) \in G',$$

где C_{13} , C_{14} не зависят от x , z , t . Поэтому на множестве G справедливы неравенства

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial^j F_k}{\partial z^j} \right| &< C_{13} [x^2 + \sigma^2(x)]^{j/2} e^{-lx}, \quad \left| \frac{\partial^j F_k}{\partial t^j} \right| < C_{13} [\sigma(x)]^{j/2} e^{-lx}, \quad j = 1, 2, \\ x \left| \frac{\partial^j F_m}{\partial z^j} \right| &< C_{14} \sqrt{x} [(x^2 + \gamma^2 - 1)^2 + 4\gamma^2]^{j/4} e^{-lx}, \quad x \left| \frac{\partial^j F_m}{\partial t^j} \right| < C_{15} \sqrt{x} e^{-lx}, \quad j = 1, 2. \end{aligned}$$

Окончательно всюду на указанном множестве получаем оценки

$$x \left| \frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k} \right| < C_{16} \left\{ \sqrt{x} \left(1 + [(x^2 + \gamma^2 - 1)^2 + 4\gamma^2]^{k/4} \right) + x \left(1 + [x^2 + \sigma^2(x)]^{k/2} \right) \right\} e^{-lx}, \quad (11)$$

$$x \left| \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k} \right| \leq C_{17} \left\{ \sqrt{x} + x (1 + [\sigma(x)]^{k/2}) \right\} e^{-lx}, \quad k = 1, 2. \quad (12)$$

Отсюда следует, что $x \frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k} \rightarrow 0$, $x \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +0$ равномерно относительно $z \leq 0$, $t \geq 0$.

Поэтому $x \frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k}$, $x \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k}$ можно доопределить до непрерывных на множестве G' и равных нулю в

точках $(0, z, t)$ функций. За этими функциями мы сохраним прежние обозначения. Заметим, что равенство (10), умноженное на x , будет справедливым на G' .

Поскольку $|J_0(xr)| \leq 1 \quad \forall x \geq 0, \forall r \geq 0$, то из (11), (12) следует, что интегралы

$$\int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k}(x, z, t) x dx, \quad \int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k}(x, z, t) x dx, \quad k = 1, 2, \quad (13)$$

сходятся равномерно по переменным $r > 0, z \leq 0, t \geq 0$ по признаку Вейерштрасса. Кроме того, подынтегральные функции в (13) непрерывны на множестве X' : $x \geq 0, r > 0, z \leq 0, t \geq 0$. Поэтому решение $\Phi(r, z, t)$ имеет на множестве Ω' непрерывные частные производные по z и t до второго порядка включительно, причем

$$\frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k} = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial^k \Phi}{\partial z^k}(x, z, t) x dx, \quad \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k} = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial^k \Phi}{\partial t^k}(x, z, t) x dx, \quad k = 1, 2.$$

Подынтегральная функция в (3) имеет на X' непрерывную частную производную по r до второго порядка включительно. Воспользуемся соотношениями (см. [6])

$$J'_0(u) = -J_1(u), \quad J'_1(u) = J_0(u) - \frac{J_1(u)}{u},$$

где $J_1(u)$ — функция Бесселя первого порядка. Тогда

$$\int_0^{+\infty} J'_0(xr) \Phi(x, z, t) x^2 dx = - \int_0^{+\infty} J_1(xr) \Phi(x, z, t) x^2 dx, \quad (14)$$

$$\int_0^{+\infty} J''_0(xr) \Phi(x, z, t) x^3 dx = - \int_0^{+\infty} J_0(xr) \Phi(x, z, t) x^3 dx + \frac{1}{r} \int_0^{+\infty} J_1(xr) \Phi(x, z, t) x^2 dx. \quad (15)$$

В силу оценки (см. [2])

$$x |\Phi(x, z, t)| \leq C_{18} (\sqrt{x} + x) e^{-\lambda x}, \quad (x, z, t) \in G',$$

где C_{18} не зависит от x, z, t , а также в силу неравенств

$$|J_k(xr)| \leq 1, \quad x \geq 0, \quad r \geq 0, \quad k = 0, 1, \quad \frac{|J_1(xr)|}{r} < \frac{1}{r_0}, \quad x \geq 0, \quad r \geq r_0,$$

интеграл в левой части (14) сходится равномерно на множестве Ω' по признаку Вейерштрасса, а интеграл в левой части (15) — равномерно на множестве $r \geq r_0, z \leq 0, t \geq 0$ по тому же признаку, где r_0 — любое положительное число. Тогда решение $\Phi(r, z, t)$ будет иметь на Ω' непрерывную частную производную по r до второго порядка включительно, а в области Ω будет иметь место равенство

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2}{\partial r^2} \int_0^{+\infty} J_0(xr) \Phi(x, z, t) x dx + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \int_0^{+\infty} J_0(xr) \Phi(x, z, t) x dx = \\ & = \int_0^{+\infty} J''_0(xr) \Phi(x, z, t) x^3 dx + \frac{1}{r} \int_0^{+\infty} J'_0(xr) \Phi(x, z, t) x^2 dx = - \int_0^{+\infty} J_0(xr) \Phi(x, z, t) x^3 dx. \end{aligned}$$

Мы воспользовались соотношениями (14), (15). Поэтому

$$\Delta \Phi = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \left\{ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2}(x, z, t) - x^2 \Phi(x, z, t) \right\} x dx = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2}(x, z, t) x dx = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2},$$

т.е. функция $\Phi(r, z, t)$ удовлетворяет уравнению (1).

Покажем, что граничное условие при $z = 0$ также удовлетворяется. В интеграле I_{lr} сделаем замену $s = \eta - x$. Обозначим после этого подынтегральную функцию указанного интеграла через $g_0(s, x, z, t)$. Для f_0 и g_0 имеем

$$\left. \frac{\partial^2 f_0}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial f_0}{\partial z} \right|_{z=0} = \frac{B e^{i(s+x)t-lx}}{[i(s+x) + \gamma]^2 + 1}, \quad \left. \frac{\partial^2 g_0}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial g_0}{\partial z} \right|_{z=0} = -\frac{B e^{i(s+x)t-lx}}{[i(s+x) + \gamma]^2 + 1}.$$

Поэтому

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (I_{ll} + I_{lr})|_{z=0} + \beta \frac{\partial}{\partial z} (I_{ll} + I_{lr})|_{z=0} = 0, \quad x > 0, \quad t \geq 0.$$

Точно также можно показать, что для тех же x, t справедливо равенство

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (I_{2l} + I_{2r})|_{z=0} + \beta \frac{\partial}{\partial z} (I_{2l} + I_{2r})|_{z=0} = 0.$$

Такому же однородному граничному условию удовлетворяет каждая функция F_k , $k = 1, 2$. В самом деле, $\sigma^2(x) - \beta \sqrt{x^2 - \sigma^2(x)} = 0 \quad \forall x > 0$. Поэтому при $x > 0, t \geq 0$ имеем

$$\left. \frac{\partial^2 F_k}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial F_k}{\partial z} \right|_{z=0} = \frac{B e^{\pm i \sigma(x)t - lx} \sqrt{x^2 - \sigma^2(x)}}{\sigma(x) \{ [\pm i \sigma(x) + \gamma]^2 + 1 \} (2\sqrt{x^2 - \sigma^2(x)} + \beta)} \{ \pm \sigma^2(x) \mp \beta \sqrt{x^2 - \sigma^2(x)} \} = 0.$$

Но для функций $F_m(x, z, t)$, $m = 3, 4$ получим

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (F_3 + F_4)|_{z=0} + \beta \frac{\partial}{\partial z} (F_3 + F_4)|_{z=0} = -i B e^{-\gamma t - lx} \sin t, \quad x > 0, \quad t \geq 0.$$

Принимая во внимание (5), будем иметь граничное условие для функции $\Phi(x, z, t)$:

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=0} = A e^{-\gamma t - lx} \sin t, \quad x > 0, \quad t \geq 0.$$

Таким образом, в силу доказанного выше, окончательно получаем

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} \right|_{z=0} + \beta \left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=0} = A e^{-\gamma t} \sin t \int_0^{+\infty} J_0(xr) e^{-lx} x dx = \frac{p_0}{\rho_0 a^2} f(r) e^{-\gamma t} \sin t, \quad r > 0, \quad t \geq 0,$$

т.е. граничное условие при $z = 0$ удовлетворяется. При этом мы воспользовались равенством (см. [6])

$$\int_0^{+\infty} J_0(xr) e^{-lx} x dx = \frac{l}{(r^2 + l^2)^{3/2}}.$$

Докажем, что $\Phi(r, z, t) \rightarrow 0$ при $\sqrt{r^2 + z^2} \rightarrow +0$ и любом фиксированном $t \geq 0$. В [2] была получена оценка

$$|\Phi(r, z, t)| < \frac{\tilde{C}}{\sqrt{r}}, \quad r \gg 1, \quad (16)$$

где $\tilde{C}$ не зависит от $z \leq 0, t \geq 0$. Откуда следует, что $\Phi(r, z, t) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow +\infty$ равномерно относительно z и t из указанных промежутков. Покажем, что $\Phi(r, z, t) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow -\infty$ равномерно от-

носителем $r > 0$ и любом фиксированном $t \geq 0$. При любых $x > 0$, $z < -1$, $t \geq 0$ рассмотрим произведение $xI_{II}(x, z, t)$ и сделаем замену $u = \sqrt{\eta^2 - x^2}$. Получим

$$\begin{aligned} xI_{II}(x, z, t) &= - \int_0^{+\infty} \frac{Bx e^{ir\sqrt{u^2+x^2}-lx+i|z|u} u du}{\left[\left(i\sqrt{u^2+x^2} + \gamma \right)^2 + 1 \right] \left[u^2 + x^2 + i\beta u \right] \sqrt{u^2+x^2}} := \int_0^{+\infty} h(u, x, t) e^{i|z|u} du = \\ &= \int_0^{u_0(z)} + \int_{u_0(z)}^{+\infty} := I_1 + I_2, \quad u_0(z) = \frac{1}{|z|^{1/4}}. \end{aligned}$$

Пусть $0 < u \leq u_0(z)$, $0 < x \leq \delta_1$, $t \geq 0$, а δ_1 — любое число из интервала $(0, \gamma)$. Тогда для h и I_1 имеем оценки

$$|h| < \frac{B e^{-lx}}{\beta \left[\gamma^2 + 1 - u_0^2(z) - \delta_1^2 \right]} < \frac{B e^{-lx}}{\beta (\gamma^2 - \delta_1^2)}, \quad |I_1| \leq \frac{C_{19} e^{-lx}}{|z|^{1/4}}.$$

Пусть $0 \leq u \leq u_0(z)$, $x > \delta_1$, $t \geq 0$. Тогда для h и I_1 имеем оценки

$$|h| < \frac{Bx e^{-lx} u}{2\gamma (u^2 + \delta_1^2)^2} \leq \frac{Bx e^{-lx}}{2\gamma} \max_{u \in [0,1]} \frac{u}{(u^2 + \delta_1^2)^2}, \quad |I_1| < \frac{C_{20}}{|z|^{1/4}} x e^{-lx}.$$

Поэтому при всех $x > 0$, $z < -1$, $t \geq 0$ получаем

$$|I_1| < \frac{C_{21} e^{-lx}}{|z|^{1/4}} (x + 1).$$

Заметим, что функция h имеет непрерывную частную производную по u на полупрямой $[u_0(z), +\infty)$ при любых фиксированных $x > 0$, $t \geq 0$. Для оценки I_2 выполним интегрирование по частям:

$$I_2 = \frac{i}{|z|} e^{i|z|^{3/4}} h\{u_0(z), x, t\} - \frac{i}{|z|} \int_{u_0(z)}^{+\infty} e^{i|z|u} \frac{\partial h}{\partial u}(u, x, t) du,$$

где подстановка на $+\infty$ равна нулю и

$$\frac{\partial h}{\partial u} = \frac{h}{u} \left\{ 1 + \frac{itu^2}{\sqrt{u^2+x^2}} - \frac{u^2}{u^2+x^2} - \frac{2u^2(i\gamma - \sqrt{u^2+x^2})}{\sqrt{u^2+x^2} \left[(i\sqrt{u^2+x^2} + \gamma)^2 + 1 \right]} - \frac{u(2u+i\beta)}{u^2+x^2+i\beta u} \right\} := \frac{h}{u} \left(1 + \sum_{k=1}^4 h_k \right).$$

Так как при $u \geq u_0(z)$, $x > 0$, $t \geq 0$ справедливо неравенство

$$\left| \frac{h}{u} \right| < \frac{Bx e^{-lx}}{2\beta \gamma u^3}, \quad |h_1| \leq tu, \quad |h_2| < 1, \quad |h_3| < \frac{u\sqrt{u^2+x^2}+\gamma^2}{\gamma\sqrt{u^2+x^2}} < 1 + \frac{u}{\gamma}, \quad |h_4| < \frac{\sqrt{4u^2+\beta^2}}{u^4} < 2 + \frac{\beta}{u},$$

то при тех же u , x , t справедливо неравенство

$$\left| \frac{\partial h}{\partial u} \right| < \left\{ \frac{\gamma t + 1}{2\beta \gamma^2 u^2} + \frac{5}{2\beta \gamma u^3} + \frac{1}{2\gamma u^4} \right\} Bx e^{-lx}.$$

Учитывая, что при $x > 0$, $t \geq 0$ справедливо неравенство

$$|h\{u_0(z), x, t\}| < \frac{Bx e^{-lx}}{2\beta \gamma} |z|^{1/2},$$

для I_2 при всех $x > 0$, $z < -1$, $t \geq 0$ получаем оценку

$$|I_2| < \left\{ \frac{C_{22}(t)}{|z|^{3/4}} + \frac{C_{23}}{|z|^{1/2}} + \frac{C_{24}}{|z|^{1/4}} \right\} x e^{-tx} < \frac{C_{25}(t)}{|z|^{1/4}} x e^{-tx}, \quad C_{25}(t) > 0.$$

Следовательно,

$$x|I_{II}| < \frac{C_{26}(t)}{|z|^{1/4}} (x+1) e^{-tx}, \quad x > 0, \quad z < -1, \quad t \geq 0. \quad (17)$$

В [2] было показано, что $xI_{II}|_{x=0} = 0 \forall z \leq 0, \forall t \geq 0$. Поэтому неравенство (17) справедливо $\forall x \geq 0$. Аналогичные неравенства имеют место для произведений $xI_{2l}, xI_{1r}, xI_{2r}$. Тогда получим

$$\left| \int_0^{+\infty} J_0(xr) \{I_{II}(x, z, t) + \dots + I_{2r}(x, z, t)\} x dx \right| < \frac{C_{27}(t)}{|z|^{1/4}} \int_0^{+\infty} (x+1) e^{-tx} dx < \frac{C_{28}(t)}{|z|^{1/4}}, \quad C_{28}(t) > 0.$$

Рассуждая как в [2], для функций F_k , $k = 1, 2$, получаем неравенства

$$|F_k| \leq C_{29} e^{-|z|\sqrt{x^2 - \sigma^2(x)}}, \quad (x, z, t) \in G',$$

где $\sigma(0) = \lim_{x \rightarrow +0} \sigma(x) = 0$. Поэтому при любом $z < 0$ имеем

$$\left| \int_0^{+\infty} J_0(xr) F_k(x, z, t) x dx \right| \leq C_{29} \int_0^{+\infty} x e^{-|z|\sqrt{x^2 - \sigma^2(x)}} dx = \frac{C_{29}}{2} \int_0^{+\infty} e^{-|z|\lambda(s)} ds = \frac{C_{29}}{2} \left(\int_0^{s_1} + \int_{s_1}^{+\infty} \right) := \frac{C_{29}}{2} (I_3 + I_4),$$

где $s = x^2$, $\lambda(s) = \sqrt{s - \frac{\beta^4}{4} + \beta^2 s + \frac{\beta^2}{2}}$, а s_1 будет выбрано ниже. Заметим, что интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-|z|\lambda(s)} ds$ сходится по признаку сравнения: $\lim_{s \rightarrow +\infty} s^2 e^{-|z|\lambda(s)} = 0$.

Получим оценки для I_3 и I_4 . Функция $\lambda(s)$ непрерывно дифференцируема на $(0, +\infty)$, причем $\lambda'(s) > 0$ всюду на этом промежутке, т.е. $\lambda(s)$ возрастает. Положим $\lambda'(0) = \lim_{s \rightarrow +0} \lambda'(s) = \frac{1}{\beta}$. Выберем s_1 таким, чтобы $\lambda'(s) > \frac{1}{2\beta} \forall s \in [0, s_1]$. Тогда для указанных s по формуле конечных приращений Лагранжа будем иметь

$$\lambda(s) - \frac{s}{2\beta} = \left\{ \lambda'(\tilde{s}) - \frac{1}{2\beta} \right\} s, \quad \tilde{s} \in (0, s),$$

т.е. $\lambda(s) \geq \frac{s}{2\beta} \forall s \in [0, s_1]$ и для I_3 получаем

$$I_3 \leq \int_0^{s_1} e^{-\frac{|z|s}{2\beta}} ds = \frac{2\beta}{|z|} \left(1 - e^{-\frac{|z|s_1}{2\beta}} \right).$$

Пусть $z < -1$. Для I_4 имеем

$$I_4 = \int_{s_1}^{+\infty} e^{-(|z|-1)\lambda(s)} e^{-\lambda(s)} ds \leq C_{30} e^{-|z|\lambda(s_1)}, \quad C_{30} = e^{\lambda(s_1)} \int_{s_1}^{+\infty} e^{-\lambda(s)} ds > 0.$$

Рассуждая как в [2], для функций F_m , $m = 3, 4$, получаем неравенства

$$x|F_m| \leq C_{31} \sqrt{x} e^{-|z|\sqrt{\gamma^2 + 1} \cos \psi_m(x) - tx}, \quad (x, z, t) \in G',$$

где $\psi_m(0) = \lim_{x \rightarrow +0} \psi_m(x) = \mp \frac{\pi}{2} \pm \arctg \gamma$. Функции $\psi_m(x)$ непрерывно дифференцируемы на $(0, +\infty)$, причем $\{\cos \psi_m(x)\}' > 0$ всюду на этом промежутке, т.е. $\cos \psi_m(x)$ возрастают. Поэтому при $z < 0$ имеем

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{+\infty} J_0(xr) F_m(x, z, t) x dx \right| &\leq C_{31} \int_0^{+\infty} e^{-|z|\sqrt{\gamma^2+1} \cos \psi_m(x) - Lx} \sqrt{x} dx \leq \\ &\leq C_{31} e^{-|z|\tilde{\gamma}} \int_0^{+\infty} e^{-Lx} \sqrt{x} dx = C_{32} e^{-|z|\tilde{\gamma}}, \quad \tilde{\gamma} = \sqrt{\gamma^2+1} \sin(\arctg \gamma) > 0. \end{aligned}$$

Окончательно при $z < -1$ будем иметь

$$|\varphi(r, z, t)| < \frac{C_{28}(t)}{|z|^{1/4}} + C_{32} e^{-|z|\tilde{\gamma}} + C_{33} e^{-|z|\lambda(s_1)} + \frac{C_{34}}{|z|} \left(1 - e^{-\frac{|z|s_1}{2\beta}} \right),$$

где $0 < C_{28}(t) < a't + b' \forall t \geq 0$ и фиксированных $a' > 0, b' > 0$, не зависящих от r, z . Откуда следует, что $\varphi(r, z, t) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow -\infty$ равномерно относительно $r > 0$ и любом фиксированном $t \geq 0$.

Вместе с (16) это означает, что $\varphi(r, z, t) \rightarrow 0$ при $\sqrt{r^2 + z^2} \rightarrow +\infty$ и любом фиксированном $t \geq 0$.

Ограниченность $\varphi(r, z, t)$ на множестве Ω' была установлена в [2]. Докажем, наконец, что начальные условия также удовлетворяются.

Положим в (4) $t = 0$. Получим

$$\Phi(x, z, 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} \frac{A e^{-Lx + z\sqrt{p^2+x^2}} dp}{[(p+\gamma)^2+1](p^2+\beta\sqrt{p^2+x^2})} := \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F_0(p, x, z) dp.$$

Рассмотрим замкнутую кривую Γ_R , состоящую из отрезка $L_R: [b-iR, b+iR]$ и дуги окружности $C_R: |p| = R, \operatorname{Re} p \geq b (R > b)$. Так как функция F_0 является аналитической в правой полуплоскости $\operatorname{Re} p > 0$, то по теореме Коши

$$\int_{\Gamma_R} F_0 dp = \int_{L_R} F_0 dp + \int_{C_R} F_0 dp = 0. \quad (18)$$

При всех $p \in C_R$ для достаточно больших R , всех $z \leq 0$ и любого фиксированного $x > 0$ справедлива оценка (см. [2])

$$|F_0(p, x, z)| \leq \frac{A}{2\pi [(R-\gamma)^2-1] (R^2-\beta\sqrt{R^2+x^2})}. \quad (19)$$

Поэтому

$$\left| \int_{C_R} F_0 dp \right| \leq \int_{C_R} |F_0| dl < \frac{AR}{2[(R-\gamma)^2-1] (R^2-\beta\sqrt{R^2+x^2})} \rightarrow 0, \quad R \rightarrow +\infty.$$

Переходя в (18) к пределу при $R \rightarrow +\infty$, в силу сходимости интеграла (4), получаем

$$\int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F_0(p, x, z) dp = 0 \quad \forall x > 0, \quad \forall z \leq 0.$$

Откуда следует, что $\varphi(r, z, 0) = 0$ при всех $r > 0, z \leq 0$.

Ранее мы получили равенство

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(r, z, t) = \int_0^{+\infty} J_0(xr) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(x, z, t) x dx, \quad (r, z, t) \in \Omega'.$$

В силу доказанного выше имеем

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 2\pi i \sum_{n=1}^4 p_n F_n - \frac{\partial I_{1l}}{\partial t} - \frac{\partial I_{1r}}{\partial t} - \frac{\partial I_{2l}}{\partial t} - \frac{\partial I_{2r}}{\partial t}, \quad (x, z, t) \in G,$$

где частные производные от интегралов справа равны интегралам от частных производных подынтегральных функций. Поэтому

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x, z, t) = \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F(p, x, z, t) p dp. \quad (20)$$

Полагая в (20) $t = 0$, получаем

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x, z, 0) = \int_{b-i\infty}^{b+i\infty} F_0(p, x, z) p dp.$$

С помощью теоремы Коши для функции $F_0(p, x, z)p$ и кривой Γ_R , а также оценки (19) убеждаемся, что последний интеграл равен нулю при всех $x > 0$, $z \leq 0$, т.е. $\frac{\partial \Phi}{\partial t}(r, z, 0) = 0$ при всех $z \leq 0$, $r > 0$.

Таким образом, доказана

Теорема. Задача (1), (2) имеет классическое решение, представимое в виде интеграла (3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bromwich T.J.I.A. On the influence of gravity on elastic waves and, in particular, on the vibrations of an elastic Globe // Proc. London Math. Soc. 1898. V. 30. P. 98–120.
2. Ильясов Х.Х., Кравцов А.В., Кравцов Ал.В., Кузнецов С.В. Интегральное представление решения нестационарной задачи Лэмба в случае предельного значения коэффициента Пуассона // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2022. Т. 62. № 3. С. 478–487.
3. Ильясов Х.Х., Кравцов А.В., Кузнецов С.В., Секерж-Зенькович С.Я. Аналитическое решение задачи Лэмба в случае предельного значения коэффициента Пуассона // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2019. Т. 59. № 4. С. 597–610.
4. Ильясов Х.Х., Кравцов А.В., Кузнецов С.В., Секерж-Зенькович С.Я. Внешняя пространственная задача Лэмба. Распределенная по поверхности гармоническая нагрузка // Изв. РАН. Механ. твердого тела. 2016. № 1. С. 50–56.
5. Кравцов А.В., Кузнецов С.В., Секерж-Зенькович С.Я. Конечноэлементные модели в задаче Лэмба // Изв. РАН. Механ. твердого тела. 2011. № 6. С. 160–169.
6. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Гос. изд. физ.-мат. лит-ры, 1963.